



# Svogūnai

Allium cepa L.

Svogūnų auginimui tinka priemoliai, priemoliai, o esant lietinimui net ir smėlingos dirvos. Dirva turi būti humusinga ir kartu pralaidi vandeniui, pH reakcija didesnė nei 6,5. Svogūnams auginti netinka labai sunkios, šaltos ir šlapios dirvos.

**Sėjomaina.** Svogūnai auginami po javų, bulvių, agurkų, pomidorų, morkų. Nepatartina auginti svogūnų po burokėlių, runkelių, kopūstų, porų, kukurūzų bei kitų svogūninių augalų, pvz., tulpių, lelijų ir pan.

**Dirvos paruošimas.** Egzistuoja dvi dirvos paruošimo sėjai mokyklos:

- gilus dirvos įdirbimas, fosforo bei kalio trąšų išbėrimas ir kultivavimas iš rudens. Seklus beveik paviršinis dirvos dirbimas pavasarį ir sėjimas paviršiuje;
- gilus perkasimas pavasarį išmaišant trąšas, paviršiaus privolavimas, kreipiant dėmesį į tai, kad dirva neperdžiūtų.

Kiekvienas būdas turi savo privalumų ir trūkumų. Pirmuoju atveju svogūnai geriau sudygsa, ypač sausą pavasarį, ir geriau auga pirmuosiuose augimo tarpsniuose. Tačiau vėliau, ypač jei prasideda intensyvūs krituliai, dirva supuola, joje ima trūkti oro, ir dėl to sulėtėja augimas liepos antrojeje pusėje ir rugpjūtį.

## Hybing F1

Ankstyvas „Rijnsburger“ tipo hibridas. Suformuoja dideles, apvalias ropeles. Lukštas šviesus, šiaudų atspalvio, gana tvirtas tokio ankstyvumo hibridui. Rekomenduojama auginti sunkesnėse, pakankamai drėgmės turinčiose dirvose. Nepaisant ankstyvumo, svogūnai gerai sandėliuojasi! Pakelyje 250 sėklų.



## Alonso F1

Derlingas hibridas, tinkamas ilgam sandėliavimui. Ropelės labai vienodo dydžio, apvalios, nesuplokštėja kai svogūnai užauga dideli. Labai stipri šaknų sistema. Lukštas tvirtas, gerai priglundęs, šviesiai rusvo atspalvio. Lauke tiesiai į žemę sėjami balandžio mėnesį, tačiau rekomenduojama sodinti daigais, taip ropelės greičiau užaugs ir subręs. Pakelyje 250 sėklų.





## Exhibition

Labaidideli, sultingi, saldaus ir švelnaus skonio salotiniai svogūnai, skirti šviežiam vartojimui. Vegetacijos laikotarpis 120-160 dienų. Ropelės pailgai ovalios, storais kakleliais, šviesiai geltonu lukštu. Užauga iki 360-600 g svorio, o auginant ilgiau – net iki 1 kg! Dėl ilgos vegetacijos šiuos svogūnus patartina auginti sodinant daigais. Kuo ilgiau auga, tuo didesnės ropelės užauga. Veislė reikli tręšimui ir laistymui. Visiškai subrendusius, apdžiovintus svogūnus gerai užsidariusiu kakleliu, tinkamomis sąlygomis galima išlaikyti iki 3 mėnesių. Nustebinkite kaimynus užauginę didžiausią svogūną! Pakelyje 100 sėklų.



## Red Baron

Derlinga, vidutinio vėlyvumo, Bejo Zaden veislė raudonas lukštais. Vegetacijos trukmė apie 130 dienų. Ropelės plokščiai apvalios, tvirtos lukšto, pusiau aštraus skonio, pakankamai stambios – 85-100 g svorio. Subrendusių svogūnų lukštai labai gražūs, tamsiai raudoni, vidus – šviesiai violetinis, laiškai sultingi, rausvi, apie 18-24 g svorio. Subrendę svogūnai laikosi iki 5-6 mėn. Tinka džiovimui. Pakelyje 250 sėklų.



Red Baron

Antruoju atveju iškyla pavojus, kad dirva išdžius, ypač pavasarį, o dėl to daigeliai gali būti prastesni. Augalai pradžioje auga blogiau, tačiau vėliau, kai dirva suslūgsta, ima sparčiai augti ir paprastai sunkesnėse dirvose gaunamas gausnis derlius. Tad rekomenduojama įdirbimo būdą pritaikyti prie esamos dirvos struktūros. Reikia atsiminti, kad supuolęs dirvos paviršius – didžiausias pavojus dygstantiems svogūnams, vadinasi, tai yra vienas iš svarbiausių veiksnių, ribojančių derlių.

**Sėja.** Rekomenduojama svogūnus sėti juostomis – lysvėmis. Sėklų kiekis vienam eilutės ilgio metrui turi būti 25-35 vienetai, o sėjimo gylis apie 2 cm. Pagal bendrąsias rekomendacijas sėjama 2-3 cm gylyje lengvoje dirvose, 1-1,5 cm priemolio dirvose, 0,5-1 cm priemolio dirvose. Norint užauginti didelius svogūnus, galima sėti apie 25 sėklas vienam metrui.

**Sėjos laikas.** Svogūnų sėklos turi kietą apvalkalą, todėl labai lėtai brinksta ir dygsta. Sėti reikia kuo anksčiau, kol dirvoje yra pakankamai drėgmės, nes svogūnų sėklos dygsta ilgai – apie 3-4 savaites (drėgnoje dirvoje sudygsta po 14-16 dienų, o sausesnėje – po mėnesio). Taip pat svarbu, kad, dygstant ir sudygus sėkloms, lauko temperatūra nebūtų žemesnė negu 2-4°C. Optimaliausias sėjos laikas yra balandžio mėnuo. Dirvos dirbimą ir sėją reikia pradėti tuomet, kai dirva pakankamai pradžiū, geriausiai apsiniaukusiomis ir nevėjuotomis dienomis.

Auginti svogūnus iš sėklų, sėjant tiesiai į dirvą yra gana sudėtinga – būtina kruopščiai paruošti dirvą, reikalinga intensyvi priežiūra. Todėl daržininkams – entuziastams, kuriems nepavyksta išauginti svogūnų iš sėklų, rekomenduojame auginti svogūnus sodinant daigais. Tai patikimas ir užtikrintas būdas išauginti ilgos vegetacijos svogūnus, pavyzdžiui veislę Exhibition.

**Derliaus nuėmimas.** Derlių imti rekomenduojame tuo metu, kai dauguma laiškų nulinkę, bet dar žali. Laukti, kol laiškai visiškai išdžius, nepatartina, nes blogėja lukštų kokybė ir svogūnai prasčiau laikosi sandėliuojant.

## Parade

Veislė skirta svogūnų laiškų auginimui. Vegetacijos trukmė 60-75 dienos. Neformuoja ropelės, nėra sustorėjimo šaknies dalyje. Laiškai tamsiai žali, statūs ir standūs, nelinkę išgulti, puikios išvaizdos, sultingi, švelnaus skonio. Vieno laiškinių svogūno svoris apie 15-20 g. Nupjauti prie pagrindo laiškai greitai atauga, todėl per sezoną galima gauti kelis laiškų derlius. Pakelyje 250 sėklų.

