



**BALTIC
SEEDS**

**KATALOGAS
2025**



TURINYS



3-4 psl.

PAPRIKOS



5 psl.

ARBŪZAI



5-8 psl.

POMIDORAI



10 psl.

CUKINIJOS



11-15 psl.

AGURKAI



16 psl.

PETRAŽOLĖS



17-24 psl.

MORKOS



25-26 psl.

ŠPINATAI



26 psl.

KALENDROS



27-28 psl.

RIDIKĖLIAI



29-32 psl.

BUROKĖLIAI



33-36 psl.

BALTAGŪŽIAI
KOPŪSTAI



36 psl.

ROPINIAI
KOPŪSTAI



37-38 psl.

PEKINO
KOPŪSTAI



38 psl.

PAK-CHOY



39-40 psl.

ŽIEDINIAI
KOPŪSTAI



40 psl.

LAPINIAI
KOPŪSTAI



41 psl.

GARBANOTIEJI
KOPŪSTAI



42-43 psl.

BROKOLIAI



43 psl.

KRAPAI



45 psl.

SALIERAI



46 psl.

PANKOLIAI



47-48 psl.

PORAI



48-50 psl.

SVOGŪNAI







51 psl.

SALOTOS

PREMIER

PROFESSIONAL



Atsisiųskite katalogą nuskaityę
QR kodą telefono kamera arba
įvedę nuorodą interneto
naršyklėje:

www.balticseeds.lt/katalogas2025



PAPRIKOS

Capsicum annuum L.



10 sėklų

CHAYKA F1

Naujiena



Ankstyvos, derlingos, labai atsparios ligoms olandų firmos „Bejo Zaden“, „Blok“ tipo saldžiosios paprikos, tinkamos auginti lauke, po priedangomis ir šiltnamiuose. Augalas kompaktiškas, su gerai išvystyta stipria šaknų sistema. Gerai mezga vaisius net ir nepalankiomis oro sąlygomis, yra pakantus temperatūrų pokyčiams. Vaisiai kubo formos, sveria apie 250–300 g, vienodi, storomis sienelėmis, greitai sunoksta ir įgauna sodrią raudoną spalvą. Tinka šviežiam vartojimui ir konservavimui. Aukštas atsparumas (HR): PVY: 0 / BPMoV / PaMMV / PMMoV / MGMV / TMV / ToMV / Tm: 0–2 / Xspp: 0, 2, 5.

10 sėklų

TURBINE F1



Ankstyvos olandų firmos „Bejo Zaden“ „Blok“ tipo saldžiosios paprikos, tinkamos auginti lauke, po priedangomis ar šiltnamiuose. Augalai determinantinio tipo, neaukšti (iki 75 cm), kompaktiški, gerai mezga vaisius net ir nepalankiomis oro sąlygomis. Vaisiai gana stambūs, lygūs, 3–4 sekčių, apie 6 mm storio sienelėmis, gražios geltonos spalvos, saldūs ir aromatingi. Nuskinti ilgai išlaiko gerą skonį. Sunokę vaisiai tampa geltonai oranžiniai. Tinka šviežiam vartojimui ir konservavimui.




10 sėklų

AMBOY F1



Ankstyvos, gausiai derančios olandų firmos „Bejo Zaden“ aštriosios paprikos. Vaisiai vidutinio aštrumo, labai vienodi, lygia odele, apie 14–15 cm ilgio, iki 4 cm skersmens, žalios spalvos, o sunokę – ryškiai raudoni. Augalai kompaktiški, neaukšti, tinkami auginti lauke, po priedangomis ar šiltnamiuose. Galima auginti ir didesniuose vazonuose – vešlūs augalai puikiai papuoš terasą ar balkoną. Hibridas atsparus ToMV (0). Tinka šviežiam vartojimui, džiovimui, konservavimui.



ARBŪZAI


Citrullus lanatus L. (Thunb.) Matsum. et Nakai



5 sėklos

BEDOUIN F1

Naujiena

 Vidutinio ankstyvumo, labai derlingi olandų firmos „Bejo Zaden“ *Crimson Sweet* tipo saldieji arbūzai. Vegetacijos trukmė – apie 80 dienų nuo daigų pasodinimo. Veislė tinkama auginti po priedangomis, šiltnamyje ar lauke – šiltesnėse, nuo vėjų apsaugotose vietose. Dėl energingo augimo, neilgos vegetacijos, pakantumo ne tik vėsiems, lietingiems, bet ir karštiesiems orams, ši veislė puikiai tinka auginti nepastoviomis vasaros klimato sąlygomis, kurios dažnai susiklosto Lietuvoje. Veislė nelinkusi mesti žiedų, toleruoja tankesnę sodinimą. Augalas užaugina 3–4 ovalo formos, 5–7 kg (geromis sąlygomis gali užaugti ir iki 8–10 kg) svorio vaisius, padengtus tvirta, plona (apie 12–14 mm) žalios spalvos odele su plačiomis, kontrastingomis juostelėmis. Minkštumas raudonas, nepaprastai saldus ir traškus, su nedideliu kiekiu smulkių sėklų. Tai viena iš saldžiausių arbūzų veislių, sukaupianti iki 11–13 % (Brix) cukrų. Išlaiko stabilią kokybę ilgą laiką po derliaus nuėmimo. Aukštas atsparumas (HR): Fon: 0.

POMIDORAI


Solanum lycopersicum L.




8 sėklos

MOUNTAIN VINEYARD F1


Naujiena


 Vidutinio ankstyvumo aukštaūgiai kekiniai pomidorai, skirti auginti šiltnamiuose. Vegetacijos trukmė – apie 65–75 dienos. Ši veislė, turinti natūralų *Crimson Sweet* geną, garsėja gausiu, ypač skanių, saldžių, sodriai raudonos spalvos pomidorų derliumi. Augalas stiprus, gana kompaktiškas, su trumpais tarpubambliais. Rekomenduojamas ankstyvas genėjimas. Pomidorus galima auginti 2–4 stiebais. Augalas gali užauginti apie 250–350 vaisių. Kekės ilgos, jose susiformuoja 14–24 ovalūs, apie 8–12 g svorio, ryškiai raudonos spalvos pomidoriukai be pageltimo prie vaiskočio, sukauptys daug likopeno. Vaisiai gražūs ir vienodi, tvirti ir mėsingi, puikios tekstūros, saldaus skonio, nelinkę trūkinėti, gerai laikosi nuskinti. Galima skinti kekėmis. Aukštas atsparumas (HR): Fol:1 / Fol:2 / Fol:3 / Ss / Va:0. Vidutinis atsparumas (IR): TSWV.



35 sėklos


POLFAST F1

 Labai ankstyvi olandų firmos „Bejo Zaden“ determinantiniai (žemaūgiai) pomidorai, skirti ankstyviausiam derliui. Tinka auginti lauke, po priedangomis ir šiltnamiuose. Pradeda derėti maždaug po 52 dienų nuo daigų pasodinimo. Vaisiai vidutinio stambumo, 100–150 g svorio, plokščiai apvalūs, lygūs, mėsingi, be žalio apyvaisio, turintys daug sausos masės ir ekstrakto. Greitai įgauti ryškiai raudoną vidinę ir išorinę spalvą, yra švelnaus skonio, skirti šviežiam vartojimui bei konservavimui. Hibridas pakantus nepalankioms oro sąlygoms, gerai mezga vaisius net ir vėsią, drėgną vasarą. Aukštas atsparumas (HR): Fol:0 / Fol:1 / Va.



35 sėklos


POLBIG F1

 Labai derlingi vidutinio ankstyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ determinantiniai (žemaūgiai) pomidorai. Tinka auginti lauke, po priedangomis ir šiltnamiuose. Pradeda derėti maždaug po 65 dienų nuo daigų pasodinimo. Augalai tvirti, su gerai išvystyta lapija. Keikėje susiformuoja 6–8 plokščiai apvalūs, ryškios spalvos, stambūs ir mėsingi, 180–230 g svorio vaisiai be žalio apyvaisio. Geras ankstyvumo ir vaisiaus stambumo derinys. „Polbig F1“ derlingumu nenusileidžia kai kurioms indeterminantinėms veislėms. Rekomenduojama auginti šviežiam vartojimui ir sulčių gamybai. Augalas pakantus nepalankioms oro sąlygoms, gerai mezga vaisius net ir vėsią, drėgną vasarą. Aukštas atsparumas (HR): Fol:0 / Fol:1 / For / Va:0.



35 sėklos

BENITO F1


 Derlingi vidutinio ankstyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ determinantiniai (žemaūgiai) pomidorai. Tinka auginti lauke, po priedangomis ir šiltnamiuose. Pradeda derėti maždaug po 60 dienų nuo daigų pasodinimo. Keikėje susiformuoja 7–9 vaisiai. Pomidorai vidutinio dydžio, 100–120 g svorio, pailgai ovalūs, su tvirta odele, be žalio apyvaisio, turi daug sausos masės ir ekstrakto. Tvirti, gero skonio vaisiai puikiai tinka konservavimui. Hibridas pakantus nepalankioms oro sąlygoms, gerai mezga vaisius net ir vėsią, drėgną vasarą. Aukštas atsparumas (HR): Fol:0 / Fol:1 / Va.

35 sėklos

SULTAN F1



Labai derlingi vidutinio ankstyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ determinantiniai (žemaūgiai) pomidorai. Tinka auginti lauke, po priedangomis ir šiltnamiuose. Pradeda derėti maždaug po 67 dienų nuo daigų pasodinimo. Kekeje susiformuoja 5–7 plokščiai apvalūs, stambūs ir mėsingi, 150–200 g svorio vaisiai su tankiu minkštimu. Nuskinti vaisiai ilgai išlaiko kokybišką išvaizdą. Augalas pakantus nepalankioms oro sąlygoms, gerai mezga vaisius net ir vėsią, drėgną vasarą. Aukštas atsparumas (HR): Fol:0 / Fol:1 / Va:0.




15 sėklų

TOMSK F1



Vidutinio vėlyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ determinantiniai (žemaūgiai) „Beef“ tipo pomidorai, tinkami auginti lauke, po priedangomis ir šiltnamiuose. Pradeda derėti maždaug po 70–75 dienų nuo daigų pasodinimo. Augalas tvirtas, gerai dengia vaisius. Vaisiai ryškiai raudonos spalvos, be žalio apyvaisio, stambūs (apie 200 g svorio), plokščiai apvalūs, lygūs, mėsingi, turi daug sausos masės, cukrų ir likopeno. Greitai įgauna ryškiai raudoną vidinę ir išorinę spalvą, yra puikaus skonio ir išskirtinio aromato. Galima auginti šiltnamiuose ankstyvam derliui. Hibridas pakantus nepalankioms oro sąlygoms, gerai mezga vaisius net ir vėsią, drėgną vasarą. Aukštas atsparumas (HR): Fol:0 / Fol:1 / Ss / Va:0.





35 sėklos

TOLSTOI F1



Populiariausi vidutinio ankstyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ indeterminantiniai (aukštaūgiai) pomidorai. Pradeda derėti maždaug po 70 dienų nuo daigų pasodinimo. Labai gerai auga ir dera nešildomuose polietilenuose šiltnamiuose bei lauke Lietuvos klimato sąlygomis. Vaisiai apvalūs, gražios tamsiai raudonos spalvos, 100–110 g svorio, transportabilūs ir labai skanūs. Tinka šviežiam vartojimui bei konservavimui. Gera vaisių kokybė išlieka iki 20 dienų po nuskynimo. Galima skinti kekėmis. Aukštas atsparumas (HR): Fol:0 / Fol:1 / Pf:A,B,C / ToMV / Va:0.





10 sėklų

TOIVO F1



Vidutinio vėlyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ indeterminantiniai (aukštaūgiai) pomidorai pagrindiniam derliui, tinkami auginti visą sezoną šildomuose ir nešildomuose šiltnamiuose. Veislė pakanti temperatūrų svyravimui, puikiai mezga vaisius esant nepalankioms oro sąlygoms ir temperatūrų kaitai. Augalas tvirtas, su labai stipria ir nematodams atsparia šaknų sistema. Optimalus balansas tarp lapų ir vaisių, o dėl ilgesnių tarpubamblių augalas yra mažiau imlus ligoms. Vaisiai apvalūs, vienodi, ryškiai raudonos spalvos, blizgūs, be žalio apvaisio, 180–200 g svorio. Derlių galima skinti kekėmis, jos išvaizdžios ir gražiai suformuotos. Aukštas atsparumas (HR): Fol:0 / Fol:1 / For / ToMV / Va:0. Vidutinis atsparumas (IR): Mi.



5 sėklos

BORSALINA F1



Desertiniai, ankstyvi prancūzų firmos „Gautier“ indeterminantiniai (aukštaūgiai) pomidorai. Vaisiai sunkūs, intensyviuos tamsiai raudonos spalvos, blizgūs, briaunoti. Sultingi ir skanūs. Vidutinis vaisiaus svoris 180–200 gramų. Tinkami auginti po priedangomis ir šiltnamiuose. Aukštas atsparumas (HR): Va / Vd.



5 sėklos

CAURALINA F1



Labai derlingi prancūzų firmos „Gautier“ indeterminantiniai (aukštaūgiai) pomidorai, tinkami auginti tiek labai ankstyvam, tiek vėlyvesniam derliui. Vaisiai širdies formos, priskiriami jaučio širdžių pomidorų tipui („Coeur de boeuf“), mėsingi, išskirtinio skonio. Vidutinis vaisiaus svoris yra nuo 160 iki 200 gramų. Tinkami auginti šiltnamiuose bei hidroponiniu būdu. Aukštas atsparumas (HR): Fol:0 / For / ToMV.

5 sėklos

KAKAO F1



Ankstyvas prancūzų firmos „Gautier“ hibridas. Augalas auga labai sparčiai. Vaisiai yra šiek tiek suploto rutulio formos, tamsiai rudi su žaliu atspalviu, pasižymintys nepakartojamu skoniu ir gausiu derliumi. Pomidorai sveria apie 130-150 g, dydis 57-67 mm, ilgai išsilaiko nuskinti. Rekomenduojama auginti po priedangomis arba šiltnamiuose. Aukštas atsparumas (HR): ToMV/Vd/Fo-1:0.



CUKINIJOS

Cucurbita pepo L.



Modena F1

5 sėklos

MODENA F1



Derlinga vidutinio ankstyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ hibridinė veislė, skirta auginimui po priedangomis ar atvirame grunte. Vegetacijos trukmė – apie 60 dienų. Vaisiai tolygios cilindro formos, vidutinio ilgio, ryškios, tamsiai žalios spalvos. Odelė lygi, plona. Puikiai tinka šviežiam vartojimui, konservavimui. Ilgai išsaugo šviežumą, gražią išvaizdą po derliaus nuėmimo. Vidutinis atsparumas (IR): PRV (Papajų mozaikos virusas), WMV (Arbuzų mozaikos virusas), ZYM (Cukinių geltonosios mozaikos virusas).




AGURKAI

Cucumis sativus L.



Atomic F1



20 sėklų

ABSOLUT F1



Ankstyvi olandų firmos „Bejo Zaden“ partenokarpiniai (savidulkiai) agurkai, skirti auginti stikliniuose ir plėvele dengtuose šiltnamiuose. Puikiai auga vasaros metu, karštomis ir stresinėmis sąlygomis. Augalai išaugina stiprią šaknų sistemą, pasižymi geros regeneracinėmis savybėmis ir ilgai dera. Viename mazge augalas suformuoja 2–3 vaisius. Vaisiai stambiais kauburėliais, tamsiai žalios, blizgios spalvos, cilindro formos ir vienodo dydžio. Ilgio ir storio santykis – 3,3–3,4:1. Vaisiai tvirti, traškūs ir skanūs. Tinka šviežiam vartojimui, konservavimui ir raugimui. Aukštas atsparumas (HR): Ccu. Vidutinis atsparumas (IR): CMV, CVYV, Pcu, Px.




Absolut F1

20 sėklų

ADAM F1



Labai ankstyvi olandų firmos „Bejo Zaden“ kornišonų tipo partenokarpiniai (savidulkiai) agurkai, tinkami auginti lauke, po priedangomis ar šiltnamiuose. Augalai tvirti ir gyvybingi, pasižymi puikiais regeneracinėmis savybėmis, o didžioji derliaus dalis užauga ant pagrindinio stiebo. Dera tolygiai, išauginamas gausus derlius. Vaisiai sveria 90–95 g, yra 9–10 cm ilgio, cilindro formos, tamsiai žali, tolygios ir vienodos spalvos, smulkiai kauburiuoti. Ilgio ir storio santykis – 3,2:1. Puikiai tinka šviežiam vartojimui, konservavimui ir raugimui. Aukštas atsparumas (HR): Ccu, CMV. Vidutinis atsparumas (IR): Cca, CVYV, Pcu, Px.




20 sėklų


ALPAKA F1



Ankstyvi olandų firmos „Bejo Zaden“ kornišonų tipo partenokarpiniai (savidulkiai) agurkai, tinkami auginti lauke, po priedangomis ar šiltnamiuose. Augalai tvirti ir gyvybingi, atviro tipo, pasižymi puikiais regeneracinėmis savybėmis. Hibridas išvestas perdirbimo pramonės poreikiams tenkinti ir dera tolygiai. Išauginamas gausus ir kokybiškas derlius, kurio didelę dalį sudaro nedideli agurkėliai, puikiai tinkantys marinavimui. Vaisiai cilindro formos, smulkiai kauburiuoti, tolygios tamsiai žalios spalvos, tvirti, geros konsistencijos, su mažais sėklalidžiais. Ilgio ir storio santykis – 3,1:1. Tinka šviežiam vartojimui ir konservavimui. Aukštas atsparumas (HR): Ccu, CMV. Vidutinis atsparumas (IR): CVYV, Pcu, Px.



Alpaka F1




20 sėklų

AMANT F1



Labai ankstyvi ir derlingi olandų firmos „Bejo Zaden“ partenokarpiniai (savidulkiai) agurkai, skirti auginti polietilenuose ir stikliniuose šiltnamiuose bei lauke. Pakantūs šviesos trūkumui, tinka auginti tiek ankstyvą pavasarį, tiek rudenį. Šis hibridas iš kitų tuo pat metu auginamų agurkų išsiskiria šviesia spalva. Vaisiai sveria apie 80-100 g, yra cilindro formos, šviesiai žalios spalvos, su plona odele, turintys šviesią juostą iki ½ vaisiaus ilgio, stambiai kauburiuoti. Vaisiaus ilgio ir skersmens santykis – 3:1. Tinka šviežiam vartojimui, konservavimui ir raugimui. Aukštas atsparumas (HR): Ccu. Vidutinis atsparumas (IR): CMV, CVYV, Pcu.



20 sėklų

AMAROK F1



Ankstyvi, derlingi olandų firmos „Bejo Zaden“ savidulkiai (partenokarpiniai) agurkai, tinkantys auginti tiek lauke, tiek šiltnamyje. Augalas yra atviro tipo, todėl jį lengva prižiūrėti ir skinti derlių. Puikiai regeneruojasi iki derliaus nuėmimo pabaigos. Vaisiai yra cilindro formos, tamsiai žalios spalvos ir išvaizdūs. Sėklų kamera yra maža. Vaisiaus ilgio ir storio santykis – 3,1:1. Tinka šviežiam vartojimui, o dėl savo kietumo, tvirtumo ir traškumo agurkai puikiai tinka konservavimui ir ilgalaikiam raugimui. Aukštas atsparumas (HR): Ccu, CMV. Vidutinis atsparumas (IR): CVYV, Pcu, Px.



Amarok F1

20 sėklų

AMOUR F1



Labai ankstyvi, derlingi olandų firmos „Bejo Zaden“ partenokarpiniai (savidulkiai) agurkai, skirti auginti polietilenuose ir stikliniuose šiltnamiuose. Augalai yra tvirti ir gyvybingi, pasižymi puikomis regeneracinėmis savybėmis, o didžioji derliaus dalis užauga ant pagrindinio stiebo. Vaisiai sveria 80–100 g, yra cilindro formos, stambiai kauburiuoti, tolygios žalios spalvos, nelinkę peraugti į storumą ir negelsta. Vaisiaus ilgio ir skersmens santykis – 3,2–3,3:1. Agurkai turi mažus sėklalīdzius ir ploną odelę, yra itin saldūs ir anksti derantys, todėl labai tinka šviežiam vartojimui. Tinka konservavimui ir raugimui. Aukštas atsparumas (HR): Ccu. Vidutinis atsparumas (IR): Cca, CMV, CVYV, Pcu.




20 sėklų


ANSOR F1



Ankstyvi, derlingi, intensyviai augantys olandų firmos „Bejo Zaden“ partenokarpiniai (savidulkiai) agurkai, tinkami auginti polietilenuose ir stikliniuose šiltnamiuose. Augalai yra vešlūs, suformuoja stiprią šaknų sistemą, pasižymi geromis regeneracinėmis savybėmis ir gerai mezga vaisius esant karštam orui. Vaisiai yra tvirti, blizgios, tolygios ryškiai žalios spalvos, su stambiais kauburėliais, grakštūs ir vienodo dydžio, nelinkę peraugti į storumą. Ilgio ir storio santykis – 3,3–3,4:1. Tinka šviežiam vartojimui, konservavimui ir raugimui. Aukštas atsparumas (HR): Ccu. Vidutinis atsparumas (IR): Cca, CMV, Pcu.



Ansor F1




20 sėklų

ARISTAN F1



Labai ankstyvi, derlingi olandų firmos „Bejo Zaden“ partenokarpiniai (savidulkiai) agurkai, rekomenduojami auginti po priedangomis ar šiltnamiuose. Pakantūs stresinėms augimo sąlygoms, šviesos trūkumui ir temperatūrų pokyčiams. Augalas yra atviro tipo, todėl jį lengva prižiūrėti ir skinti derlių. Vaisiai yra tamsiai žalios spalvos, pasižymi vienoda forma ir dydžiu, o ilgio ir storio santykis – 3,4:1. Tinka šviežiam vartojimui, konservavimui ir rauginimui. Aukštas atsparumas (HR): Ccu, CMV. Vidutinis atsparumas (IR): CVYV, Pcu, Px.




Aristan F1

20 sėklų

ARTIST F1



Ankstyvi, derlingi ir intensyviai augantys olandų firmos „Bejo Zaden“ partenokarpiniai (savidulkiai) agurkai, tinkami auginti tiek pavasario, tiek rudens laikotarpiu, polietilenuose ir stikliniuose šiltnamiuose, taip pat lauke. Augalai yra vešlūs, suformuoja stiprią šaknų sistemą ir pasižymi geromis regeneracinėmis savybėmis. Vaisiai yra tvirti, ryškiai žalios spalvos, su stambiais kauburėliais, labai grakštūs ir vienodo dydžio, nelinkę peraugti į storumą. Ilgio ir storio santykis – 3,3-3,4:1. Tinka šviežiam vartojimui, konservavimui ir raugimui. Aukštas atsparumas (HR): Ccu. Vidutinis atsparumas (IR): Cca, CMV, CVYV, Pcu, Px.



20 sėklų

AVION F1



Ankstyvi, derlingi ir intensyviai augantys partenokarpiniai agurkai, skirti auginti ankstyvo pavasario ir rudens laikotarpiu, taip pat vasarą šiltnamiuose ar lauke. Gerai auga ir mezga vaisius esant mažam apšviestumui, pasižymi geru atsparumu aukštai temperatūrai ir stresinėms augimo sąlygoms. Augalai yra gyvybingi, suformuoja labai stiprią šaknų sistemą ir pasižymi geromis regeneracinėmis savybėmis, todėl agurkus galima auginti lauke ar mineralinėje vatoje. Vaisiai yra ryškiai žalios spalvos, blizgūs, su stambiais kauburėliais, cilindro formos, vienodo dydžio ir nelinkę peraugti į storumą. Ilgio ir storio santykis – 3,3-3,4:1. Tinka šviežiam vartojimui, konservavimui ir raugimui. Aukštas atsparumas (HR): Ccu. Vidutinis atsparumas (IR): CMV, CVYV, Px.





60 sėklų

AKORD F1



Labai derlingi olandų firmos „Bejo Zaden“ lauko agurkai, pamėgti Lietuvos daržininkų dėl patrauklios išvaizdos, puikaus skonio vaisių ir didelio atsparumo įvairioms agurkų ligoms. Augalai tvirti, turi stiprią šaknų sistemą. Vaisiai yra cilindro formos, kauburiuoti, sodrios šviesiai žalios spalvos su kontrastingu baltu juostelių piešiniu iki 3/4 vaisiaus ilgio, aromatingi, saldūs ir neapkartantys. Vaisiaus ilgio ir skersmens santykis – 3,0:1. Agurkai proporcingai auga į ilgį ir storį, todėl gaunamas vienodų ir kokybiškų vaisių derlius. Konservuoti ir raugti agurkai išlieka kieti ir traškūs, be tuščių ertmių, nesubliukšta, išsaugo ryškią spalvą. Aukštas atsparumas: Ccu, Cca. Vidutinis atsparumas (IR): CMV, CVYV, Pcu, PRSV, ZYMV.






60 sėklų

ATOMIC F1



Populiariausi, labai derlingi olandų firmos „Bejo Zaden“ lauko agurkai. Augalai turi stiprią šaknų sistemą, yra tvirti ir gyvybingi. Vaisiai šviesiai žalios spalvos, su šviesiomis juostelėmis iki $\frac{3}{4}$ vaisiaus ilgio, vienodos cilindro formos, truputį ilgesni už „Akord F1“, nelinkę storėti ar gelsti, saldūs ir aromatingi. Vaisiaus ilgio ir skersmens santykis – 3,1-3,2:1. Idealiai tinka ilgalaikiam raugimui ir marinavimui, nes turi mažus sėklalaidžius, išsaugo šviesią spalvą, nesuminkštėja, vaisiuose nesusidaro tuščių ertmių, todėl agurkai išlieka kieti ir traškūs. Aukštas atsparumas (HR): Ccu, Cca, Pcu. Vidutinis atsparumas (IR): CMV, CVYV, Px.




60 sėklų

ATLANTIS F1



Derlingi olandų firmos „Bejo Zaden“ lauko agurkai, skirti auginti lauke ir po žemomis plėvelės ar agroplėvelės priedangomis. Vaisiai ryškiai žalios spalvos, su stambiais kauburėliais, plona odele, kieti. Vaisiaus ilgio ir skersmens santykis – 2,8-3,1:1. Vaisiai turi mažus sėklalaidžius, yra labai saldūs ir aromatingi, todėl idealiai tinka konservavimui, o ypač ilgalaikiam raugimui. Augalas atsparus ligoms, todėl gali vesti vaisius net iki rudens šalnų. Dėl savo atsparumo bakterinėms ir grybinėms ligoms ši veislė ypač tinkama ekologiškai ūkininkaujantiems daržininkams. Aukštas atsparumas (HR): Ccu. Vidutinis atsparumas (IR): Cca, CMV, CVYV, Pcu, PRSV.



60 sėklų

ALLIANZ F1



Derlingi, ankstyvi olandų firmos „Bejo Zaden“ lauko agurkai, panašūs į „Atlantis F1“, skirti konservavimui ir ilgalaikiam raugimui. Gerai dera po priedangomis ir atviraime lauke, ilgai neperauga. Tinka auginti ant juodos plėvelės. Vaisiai šiek tiek trumpesni nei „Atlantis F1“, su stambiais kauburėliais, ryškiai žalios spalvos, su šviesiomis juostomis iki $\frac{1}{3}$ ilgio, saldūs, skanūs ir aromatingi. Vaisiaus ilgio ir skersmens santykis – 3-3,1:1. Agurkai turi labai mažus sėklalaidžius, o raugti būna ypač kieti. Aukštas atsparumas (HR): Ccu. Vidutinis atsparumas (IR): Cca, CMV, CVYV, Pcu, Px.

PETRAŽOLĖS (ŠAKNINĖS)

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill



Arat



Eagle

1 g

ARAT



Vėlyva, derlinga, greitai auganti olandų firmos „Bejo Zaden“ šaknių petražolių veislė. Vegetacijos trukmė – apie 150 dienų. Šaknis baltos, šiek tiek kūgiškos, labai lygios, puikiai atrodo nuplautos, su stipriu aromatu. Didelė kokybiško derliaus dalis bendrajame derliuje, nes šaknis nelinkusios išsikraipyti. Petražolės skirtos vėlyvo rudens derliui, šviežiam vartojimui, džiovimui ir ilgam laikymui.



1 g

Halflange - EAGLE



Viena populiariausių, vėlyva olandų firmos „Bejo Zaden“ Berliner tipo šaknių petražolių veislė. Vegetacijos trukmė – apie 150 dienų. Šakniavaisiai vidutinio dydžio, lygūs, pailgesnės formos nei kitų veislių, todėl užauga sunkesni, gaunamas didesnis derlius. Dėl labai stipraus aromato, būdingo Berliner tipo veislėms, ir lygių baltų šaknių, „Eagle“ veislės petražolės puikiai tinka ne tik šviežiam vartojimui, bet ir džiovimui.




MORKOS

Daucus carota L.



Bangor F1




600 sėklų

MOKUM F1



Ankstyviausia Nanto / Amsterdamo tipo olandų firmos „Bejo Zaden“ hibridinė veislė, viena mėgstamiausių Europoje daržininkų mėgėjų tarpe, auginančių morkas pirmajam ankstyviausiam derliui.

Vegetacijos trukmė – apie 70-85 dienas. Šakniavaisiai cilindro formos, buki, šiek tiek plonesni nei įprastų Nanto tipo morkų, 18-20 cm ilgio, su labai maža šerdimi. Šios bene ankstyviausios morkos augintojų pamėgtos dėl ypatingo sultingumo, saldumo, švelnumo ir traškumo, todėl raunamos pirmiausiai, vartojamos kaip sveikas, gaivus užkandis, taip pat šviežioms salotoms ir pirmosioms sultims. Nedidelės morkytės (angl. „Baby carrot“) ypač mėgstamos vaikų, pradedamos rauti jau po 50-60 dienų. Jei norite turėti itin ankstyvą derlių, šias morkas galite pasėti iš rudens.



600 sėklų

NAPOLI F1



Ankstyvos olandų firmos „Bejo Zaden“ Nanto tipo morkos, skirtos pačiam ankstyviausiam derliui lauke ir šiltnamiuose. Vegetacijos trukmė – apie 90 dienų. Šios morkos, dėl savo ankstyvumo ir skonio, jau daugelį metų yra vienos populiariausių tarp daržininkų mėgėjų visoje Europoje. Greitai auga ir esant žemesnei temperatūrai. Pirmąjį derlių galima pradėti rauti jau po 60 dienų. Šakniavaisiai anksti įgyja būdingą vadaus ir išorės spalvą, cilindro formą ir saldų skonį. Morkos užauga 15-20 cm ilgio, sveria 70-160 g. Didelis karotino kiekis. Lapija tvirta, trumpa. Ilgas derliaus nuėmimo laikotarpis, šakniavaisiai nelinkę trūkinėti. Galima sėti iš rudens. Pasėjus birželio mėnesį ir derlių nuėmus rudenį, morkos tinkamos laikymui.

600 sėklų

NOMINATOR F1



Ankstyvos olandų firmos „Bejo Zaden“ Nanto tipo morkos. Vegetacijos trukmė – apie 95 dienos. Šakniavaisiai labai anksti įgyja ryškią spalvą ir saldų skonį. Lapija trumpa, stipri. Idealiai tinka pačiam ankstyviausiam derliui, tačiau derlių galima nuimti ir vasaros metu, nes derliaus nuėmimo laikotarpis yra ilgas. Morkos nelinkę trūkinėti, nepraranda skonio ir išvaizdos. Visiškai subręsta maždaug po 3 mėnesių nuo sėjos. Rekomenduojama auginti lengvoje, gerai įdirbtose dirvose. Pasėjus birželio mėnesį ir derlių nuėmus rudenį, morkos tinkamos laikymui. Tinka rudeninei sėjai.



600 sėklų

NIAGARA F1

Naujiena



Labai derlingos vidutinio ankstyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ Nanto/Berlikum tipo morkos. Vegetacijos trukmė – apie 100 dienų. Šakniavaisiai auga greitai, yra ilgi, stori, buki, cilindro formos, lygūs, sodrios spalvos. Ypač tinka šviežiam vartojimui, sultims spausti, sulčių išėiga iš 1 kg morkų siekia 520–570 ml. Morkos atsparios trūkinėjimui ir lūžinėjimui derliaus ėmimo metu. Gerai pakelia drėgmės trūkumą bei sausas, karštas vasaras. Esant poreikiui, derlių galima pradėti rauti anksti, nes šakniavaisiai susiformuoja greitai, anksti įgyja būdingą spalvą ir sparčiai auga. Veislė nereikli dirvožemiui. Vėliau pasėtos ir vėlavą rudenį nuimtas derlius tinka sandėliavimui.



600 sėklų

BALTIMORE F1



Labai derlinga olandų firmos „Bejo Zaden“ Nanto/Berlikum tipo hibridinė veislė, priskiriama pačioms ankstyviausioms šio tipo morkoms. Vegetacijos trukmė – apie 100–105 dienas. Universalios, gali būti auginamos tiek pirmųjų šviežių morkų, tiek vasaros ir rudens derliui. Šakniavaisiai užauga dideli, sultingi, intensyvios spalvos. Puikiai tinka salotų gamybai bei sultims spausti. Morkos auga greitai ir intensyviai, todėl jas galima auginti ir kaip antrąjį derlių. Rekomenduojama sėti gana giliai, šiek tiek rečiau, kad šakniavaisiai užaugtų stambūs ir ilgi. Hibridas išaugina stiprius, sveikus, tamsiai žalius lapus, kurie itin atsparūs grybelių ir bakterijų sukeliams ligoms. Puikiai prisitaiko prie įvairių tipų dirvožemio. Tinka šviežiam vartojimui, konservavimui ir laikymui.





600 sėklų

BANGOR F1



Pats derlingiausias vidutinio ankstyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ Berlikum tipo hibridas. Vegetacijos trukmė – apie 100–110 dienų. Morkas galima auginti ankstyvajam derliui, nes greitai augančios morkos suformuoja įprasto dydžio šakniavaisius anksčiau nei ankstyvosios Nanto tipo veislės. Taip pat galima auginti vasariniam ir rudeniniam rekordiniam stambių morkų derliui, siekiančiam iki 14 kg/m². Lapai vešlūs, vidutinio ilgio, tvirti, atsparūs ligoms. Šakniavaisiai stambūs, cilindro formos, buku galu, lygūs, apie 4 cm skersmens, 20–25 cm ilgio, 150–350 g svorio. Sėjant rečiau ir auginant giliai išpurentoje dirvoje arba lysvėse, šakniavaisiai užauga iki 30 cm ilgio, 5 cm skersmens, 500–600 g svorio. Tinka šviežiam vartojimui, konservavimui ir laikymui.



600 sėklų

BELGRADO F1



Labai derlingos vidutinio ankstyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ Berlikum tipo morkos. Žinomų morkų „Bangor H“ segmento hibridas. Vegetacijos trukmė – apie 110 dienų. Morkas galima auginti ankstyvajam derliui, nes įprasto dydžio šakniavaisius suformuoja anksčiau nei ankstyvosios Nanto tipo veislės. Taip pat galima auginti vasariniam ir rudeniniam stambių morkų derliui. Šakniavaisiai cilindro formos, lygūs, ilgi ir stambūs, šerdis nedidelė. Puiki spalva ir skonis. Labai tinka sultims, šviežioms salotoms ir konservavimui. Stiprūs, sveiki lapai atsparūs cercosporozei, alternariozei bei bakterijų sukeltoms ligoms. Rudens derliui ir laikymui skirtas morkas reikia sėti gegužės mėn. viduryje.



600 sėklų

BERLIN F1




Labai derlingos vidutinio ankstyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ Berlikum tipo morkos. Tai populiarių morkų „Bangor F1“ analogas, tinkamas ilgam laikymui. Vegetacijos trukmė – apie 113 dienų. Šakniavaisiai cilindro formos, užauga ilgi ir stambūs (daugiau nei 200 g), sultingi, saldūs, ryškios spalvos, be žalios viršūnėlės. Rekomenduojama sulčių gamybai rudens–žiemos metu. Taip pat tinka šviežioms salotoms gaminti. Morkas galima auginti ankstyvajam derliui, nes greitai augančios morkos suformuoja įprasto dydžio šakniavaisius greičiau nei ankstyvosios Nanto tipo veislės. Rudens derliui ir laikymui skirtas morkas reikia sėti gegužės mėn. viduryje.

3 g

Berlikum 2 - ROMOSA


Labai derlinga, vėlyva olandų firmos „Bejo Zaden“ Berlikum tipo morkų veislė, skirta rudeniniam derliui. Vegetacijos trukmė – apie 125 dienos. Šakniavaisiai cilindro formos, buki, lygūs, stambūs, ryškiai oranžinės spalvos, saldaus skonio. Morkos yra stambesnės ir tvirtesnės nei Nanto tipo veislės, netrūkinėja ir nelūžta. Tinka visiems dirvožemio tipams. Lapija vešli, atspari ligoms. Morkos puikiai tinka šviežiam vartojimui, konservavimui ir ilgam laikymui.



3 g

Nantes 5 - SAMSON

Gerai žinoma, derlinga, vidutinio vėlyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ „Nanto“ tipo veislė, skirta rudeniniam derliui. Vegetacijos trukmė – apie 116 dienų. Šakniavaisiai cilindro formos, bukais galais, silpnai išreikšta šerdimi, ryškios išorinės ir vidinės spalvos, vidutiniškai 16-20 cm ilgio ir 100-150 g svorio, saldūs. Lapija vešli, atspari ligoms. Tinka šviežiam vartojimui, konservavimui bei laikymui.



600 sėklų

NEVIS F1


Universalios paskirties vidutinio vėlyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ Nanto tipo morkos. Vegetacijos trukmė – apie 118 dienų. Šakniavaisiai cilindro formos, ilgi, lygūs, sodrios spalvos, išsiskiria kokybe ir vienodumu, saldžiu skoniu bei didele sulčių išeiga. Labai didelis β -karoteno kiekis (moksliniais tyrimais nustatytas vidurkis – $22,16 \text{ mg} \cdot 100\text{g}^{-1}$), prilygstantis senosioms lietuviškoms morkų veislėms. Lapija tvirta, vešli, atspari ligoms, ypač alternariozei. Rekomenduojama auginti lengvesnėse, giliai išpureniose dirvose. Vėlesnės sėjos derlius puikiai sandėliuojasi. Išskirtiniai šios veislės bruožai: didžiausia pirmos klasės morkų išeiga, puikus skonis, sultingumas ir didelis β -karoteno kiekis.





600 sėklų


NEWHALL F1

 Universaliai vidutinio vėlyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ veislė, išsiskirianti ypač kokybiška produkcija. Vegetacijos trukmė – apie 118 dienų. Šakniavaisiai cilindro formos, buku galu, ypač lygūs ir glotnūs, sodrios spalvos, sukaupia daug cukrų ir nelinkę peraugti. Rekomenduojamas šviežiam vartojimui, sulčių spaudimui ir konservavimui. Derliaus nuėmimo laikotarpis ilgas, subrendę šakniavaisiai gali gana ilgai stovėti dirvoje, nepraradami kokybės. Puikiai tinka ilgam sandėliavimui. Lapija vešli, tvirta, atspari grybinėms ir bakterinėms ligoms. Šią veislę rekomenduojame išbandyti augintojams, pamėgusiems morkas „Nectar F1“.



600 sėklų


NARBONNE F1

 Vėlyvos olandų firmos „Bejo Zaden“ Nanto tipo morkos. Vegetacijos trukmė – apie 135 dienos. Ši veislė labai populiari tarp daržininkų, auginančių morkas rudeniniam derliui ir ilgam laikymui. Šakniavaisiai cilindro formos, gana stambūs, 18-20 cm ilgio, lygūs, ryškiai oranžinės spalvos. Lapija tvirta, atspari ligoms. Šakniavaisiai itin atsparūs trūkinėjimui, todėl derlių galima imti vėliausiai – prieš pat šalnas. Dėl specifinių šios veislės savybių ir ilgo vegetacijos laikotarpio morkos sukaupia daugiau karotino ir sausųjų medžiagų. Net ilgai laikytos, šios morkos išlieka skanios, saldžios ir sultingos.



600 sėklų

NILAND F1

 Vėlyvos olandų firmos „Bejo Zaden“ Nanto tipo morkos, savo savybėmis panašios į populiariausias Lietuvoje „Bejo Zaden“ morkas „Nerac F1“. Vegetacijos trukmė – apie 130 dienų. Šakniavaisiai šiek tiek ilgesni nei „Nerac F1“ morkų, cilindro formos, lygūs, labai vienodi, gražūs, saldūs ir sultingi. Lapai vešlesni, statūs, tvirtai laikosi prie šaknies. Derliaus ėmimo laikotarpis ilgas – subrendę morkos kelias savaites gali stovėti dirvoje nepraradamos kokybės. Morkos atsparios trūkinėjimui ir pažeidimams derliaus nuėmimo ir sandėliavimo metu. Ilgai sandėliuojamų morkų kokybė nepablogėja, jos išsaugo šviežumą, spalvą ir skonį. Plautos morkos išsiskiria savo lygumu, glotnumu, ilgai išlieka gražios, blizgančios spalvos. Gerai toleruoja didesnę pasėlio tankumą.

600 sėklų

NORWAY F1



Naujos, vėlyvos olandų firmos „Bejo Zaden“ Nanto tipo, Nerac F1 segmento morkos, skirtos labai ilgam sandėliavimui. Vegetacijos trukmė – apie 131 diena. Lapija stipri, atspari ligoms. Šakniavaisiai cilindro formos, su maža šerdimi, ilgi, vienodo dydžio, lygia odele, skanūs, saldūs ir sultingi. Morkos ypač atsparios trūkinėjimui ir pažeidimams derliaus nuėmimo bei sandėliavimo metu. Ilgai sandėliuojamos morkos išsaugo šviežumą, spalvą ir skonį. Vidutinis atsparumas (IR): Ar (Alternaria radicina - juodasis puvinys), Cc (Cercospora carotae - morkų cercosporozė), Ps (Pythium sulcatum - puvinys), Pv (Pythium violae - puvinys).




600 sėklų

NERAC F1




Daugelį metų populiariausios Lietuvoje ir Europoje olandų firmos „Bejo Zaden“ Nanto tipo morkos rekomenduojamos augintojams, kurie nori turėti puikaus skonio ir geros kokybės morkų žiemos bei pavasario laikotarpiu. Vegetacijos trukmė – apie 130 dienų. Šakniavaisiai cilindro formos, labai vienodo dydžio, lygia odele, skanūs, saldūs ir sultingi. Morkos ypač atsparios pažeidimams derliaus nuėmimo ir sandėliavimo metu. Šakniavaisiai netrūkinėja, o lapija yra pakankamai stipri, kad raunant neatitrūktų nuo šakniavaisio. Ilgai sandėliuojamų morkų kokybė nepablogėja – jos išsaugo šviežumą, spalvą ir skonį. Morkos gražiai atrodo nuplautos ir ilgai išlieka gražios blizgančios spalvos. Šis hibridas priskiriamas derlingiausiems Nanto grupėje. „Nerac F1“ – iki šiol pats sėkmingiausias „Bejo Zaden“ hibridas, kuris jau daug metų Lietuvoje ir Vakarų Europos šalyse yra vienas pagrindinių hibridų, auginamų šviežių morkų rinkai po ilgo sandėliavimo. Išskirtinė šios veislės ypatybė – pakantumas įvairioms augimo sąlygoms. Morkos auga ilgai, lėtai, todėl karšti, sausringi ar drėgni ir lietingi orai neturi reikšmingos įtakos derlingumui. Ši veislė garantuoja gausų derlių.



ŠPINATAI

Spinacia oleracea L.




300 sėklų

REMBRANDT F1



Ankstyvas olandų firmos „Bejo Zaden“ hibridas, skirtas pavasario ir rudens derliui. Vegetacijos trukmė – apie 45 dienos nuo sėjos. Šiuos špinatus galima sėti rudenį, ir jie gerai žiemoja. Hibridas atsparus septynioms netikrosios miltligės rasėms. Lapai vešlūs, ryškios tamsiai žalios spalvos, lygūs, pailgai ovalios formos, su tvirtu koteliu, auga stačiai. Puikiai tinka šviežiam vartojimui ir šaldymui.



300 sėklų

REMBOUR F1




Vidutinio ankstyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ hibridas, skirtas auginti visą sezoną. Vegetacijos trukmė – apie 55 dienos nuo sėjos. Ilgesnė vegetacija leidžia prailginti derliaus ėmimo laiką, todėl derlius gaunamas gausesnis. Hibridas atsparus 8 netikrosios miltligės rasėms ir ypač atsparus sužydėjimui, todėl galima auginti visą sezoną – pavasarį, vasarą ir rudenį. Lapai lygūs, ovalūs ir mėsingi, labai gero ir švelnaus skonio. Koteliai tvirti ir ilgi. Tinka šviežiam vartojimui, ypač rekomenduojami šaldymui.

300 sėklų

SPACE F1



Vidutinio ankstyvumo, universalus, derlingas olandų firmos „Bejo Zaden“ hibridas, skirtas auginti visą sezoną – pavasarį, vasarą ir rudenį. Vegetacijos trukmė – apie 47 dienas. Lapai lygūs, pailgai ovalūs, mėsingi, tamsiai žalios spalvos, su trumpu kotelium. Šis hibridas yra ypač atsparus žydinčių augalų formavimuisi, todėl užsiauginti kokybiškų lapelių galima visą sezoną. Hibridas atsparus keturioms mitligės rasėms.



KALENDRA

Coriandrum sativum L.



Atlas®




3 g

ATLAS®

Naujiena



Derlinga, intensyviai auganti prancūzų firmos „Graines Voltz“ registruoto prekinio ženklo kalendrų veislė ATLAS® tinkama auginti šiltnamiuose pavasarį, taip pat lauke visą sezoną. Lapija stati, tvirta, vešli, vėlai pražysta ir yra atspari lapų galiukų nudegimui. Veislė išaugina didelį lapelių skaičių, užtikrinantį gerą ir stabilų derlių. Lapeliai tamsiai žalios spalvos, glotnios tekstūros. Vidutinis atsparumas (IR): Psc (kalendrų bakterinė dėmėtligė). Norint ilgiau turėti lapelių derlių, reikia sėti kelis kartus. Žali lapeliai skinami iki augalo sužydėjimo. Pavasariinių sėjos kalendrų sėklos subręsta rugpjūčio pabaigoje, pjaunama, kai paruduoja didžioji dauguma augalų. Atlas® - registruotas prekės ženklas.



RIDIKĖLIAI


Raphanus sativus L.



Rover F1



Rosetta F1



3 g ROVER F1




Jau daugelį metų populiariausias mūsų asortimente, daugelio Lietuvos augintojų pamėgtas, ypač derlingas ir universalus olandų firmos „Bejo Zaden“ ridikėlių hibridas. Vegetacijos trukmė, priklausomai nuo sėjos laiko ir tankumo, trunka apie 27–46 dienas. Galima auginti atviraime grunte ir šiltnamyje visą sezoną – nuo pavasario iki rudens. Hibridas pakantus ilgai dienai ir karščiui, atsparus žyduolių formavimuisi, todėl ridikėlius galima drąsiai auginti vasarą. Pagrindinė šaknelė ilga, bet plona, tankiau apaugusi šoninėmis šaknelėmis, kurios padeda augalui pasisavinti reikiamą kiekį vandens esant retam ar netolygiam laistymui. Sparčiai augantys ridikėliai suformuoja įprasto dydžio ropelę greičiau nei ankstyvosios veislės. Pasėjus rečiau (5–7 cm atstumu tarp sėklų eilutėje), gali užaugti labai dideli, net 7 cm skersmens ridikėliai. Šakniavaisiai apvalūs, lygia odele, skaisčiai raudonos spalvos. Minkštimas idealiai baltas, tolygaus tankumo, gero skonio, sultingas. Ridikėliai ilgai neperauga, nelinę apkarsti, trūkinėti, porėti ar vysti. Lapija vidutinio aukščio, vešli. Rekomenduojama sėti rečiau, auginti atviresnėse vietose.



3 g

ROSETTA F1


Ankstyvi olandų firmos „Bejo Zaden“ ridikėliai, tinkami auginti visą sezoną lauke – atviraime grunte. Vegetacijos trukmė – apie 25–30 dienų. Lapija tvirta, stati, vidutinio aukščio. Didelis atsparumas žyduolių formavimuisi ir netikrajai miltligei. Šakniavaisiai lygūs, apvalūs, 2,5–3,5 cm skersmens, intensyvios ryškiai raudonos spalvos, nelinkę trūkinėti, geros vidinės struktūros.



5 g

Scarlet Globe - REBEL


Universali, populiari, ankstyva olandų firmos „Bejo Zaden“ ridikėlių veislė, skirta auginti visą sezoną atviraime grunte ir šiltnamyje. Vegetacijos trukmė – apie 22–28 dienas. Šakniavaisiai intensyvios, ryškiai raudonos spalvos, apvalūs, lygūs, gana dideli ir ilgai nevysta. Minkštimas baltas, traškus ir sultingas, švelnaus, neaitraus skonio. Lapija vidutinio ilgio, tvirta. Veislė atspari žyduolių formavimuisi, pakanti karščiui, todėl ją galima auginti nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. Taip pat veislė atspari netikrajai miltligei.



5 g

RUDOLF

Labai ankstyva olandų firmos „Bejo Zaden“ veislė, skirta auginti ankstyvajam pavasario bei rudens derliui lauke, po priedangomis arba šiltnamiuose. Vegetacijos trukmė, auginant po priedangomis, yra apie 18–20 dienų, o auginant lauke – apie 20–24 dienas. Ridikėliai apvalūs, lygūs, intensyvios, ryškiai raudonos spalvos. Minkštimas baltas, tankus, traškus, sultingas, švelnaus, neaitraus skonio. Kerpė trumpa, tvirta, iki 15 cm ilgio, lapai stati. Veislė atspari netikrajai miltligei.



BUROKĖLIAI


Beta vulgaris L.



Manolo F1



Bresko F1




200 sėklų

WODAN F1



Ankstyviausias olandų firmos „Bejo Zaden“ hibridas. Vegetacijos trukmė – apie 90 dienų. Auga greitai ir anksti suformuoja šakniavaisius. Ankstyvąją brandą, skirtą ryšeliams, pasiekia per 40–50 dienų nuo sudygimo. Šakniavaisiai apvalūs, vienodo dydžio, geros prekinės išvaizdos. Lapų kerpė maža, šaknelė plona. Odelė lygi ir švelni. Minkštimas tamsiai raudonos spalvos, be koncentrinėlių žiedų, sultingas ir saldus. Greitai išverda; išvirus išlieka ryški ir intensyvi spalva bei švelnus, saldus skonis. Dėl ypač gero skonio rekomenduojamas šviežiam vartojimui ir konservavimui. Lapija vidutinio stambumo, ne itin vešli, auga vertikaliai. Hibridas labai atsparus žyduolių formavimuisi, todėl galima sėti anksti; tinka auginti po agroplėvelės priedangomis.



200 sėklų

PABLO F1




Populiariausias Lietuvoje ir Europoje olandų firmos „Bejo Zaden“ vidutinio vėlyvumo hibridas. Vegetacijos trukmė – apie 110 dienų. Labai atsparus žyduolių formavimuisi, todėl galima sėti anksti. Šakniavaisiai apvalūs, vienodos formos, su plona ir lyga odele, sveriantys 110–180 g. Kerpė maža, šaknelė plona. Lapija vidutinio stambumo, lapkočiai ploni. Minkštimas sodrios tamsiai raudonos spalvos, be koncentrinėlių žiedų, sultingas. Greitai išverda; išvirus išlieka ryški ir intensyvi spalva bei saldus, švelnus skonis. Dėl šių savybių „Pablo F1“ burokėliai ypač vertinami daržovių perdirbimo pramonėje. Tinka šviežiam vartojimui ir konservavimui. Vėlesnės sėjos derlius tinka ilgam laikymui.

200 sėklų

MANOLO F1

Nauji vidutinio vėlyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ „Pablo F1“ segmento burokėliai. Vegetacijos trukmė – apie 110–115 dienų. Veislė atspari žuoduolių formavimuisi ir pakanti nepalankioms oro sąlygoms, todėl galima sėti anksti. Lapija tvirtesnė nei „Pablo F1“, vidutinio stambumo. Lapkočiai ploni, kerpė maža, šaknelė nedidelė. Šakniavaisiai apvalūs, vienodos, kompaktiškos formos, su plona ir lyga odele, 9–12 cm skersmens, sveriantys 150–250 g. Minkštimas sodrios tamsiai raudonos spalvos, be koncentrinų žiedų, sultingas. Greitai išverda; išvirus išlieka ryški ir intensyvi spalva bei saldus, švelnus skonis. Tinka šviežiam vartojimui ir konservavimui. Vėlesnės sėjos derlius tinka ilgam laikymui.



200 sėklų

BETTOLLO F1

Vidutinio vėlyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ „Boro F1“ segmento hibridas. Vegetacijos trukmė – apie 117 dienų. Šakniavaisiai apvalūs, tvirti, su stambesne ir ilgesne pagrindine šaknimi, tankesnėmis šoninėmis šaknelėmis. Minkštimas sodrios, tamsiai raudonos spalvos, ištisinis, be koncentrinų žiedų, labai gero skonio ir sultingas. Odelė lygi ir švelni. Lapija vešli, stipri, tvirta ir sveika. Skrotelė vidutinio dydžio. Dėl tankesnių šoninių šaknelių burokėliai yra atsparesni drėgmės trūkumui. „Bettollo F1“ sukaupia daugiausia sausųjų medžiagų ir cukrų. Dėl saldaus skonio puikiai tinka spausti sultis. Greitai išverda; išvirus išlieka ryški ir intensyvi spalva bei saldus, švelnus skonis. Tinka šviežiam vartojimui, konservavimui ir ilgam laikymui.




200 sėklų

BORO F1


Labai derlingas vidutinio vėlyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ hibridas. Vegetacijos trukmė – apie 117 dienų. Burokėliai išvesti auginti kontinentinio klimato sąlygomis (didelė paros ir metų temperatūrų amplitudė, nedidelis kritulių kiekis, mišrus metų laikai), todėl yra ypač pakantūs drėgmės trūkumui, aukštomis temperatūroms ir atsparūs ligoms. Šakniavaisiai apvalūs, šiek tiek stambesni ir drūtesni nei „Pablo F1“, su storesne ir ilgesne pagrindine šaknimi, vėlesne lapija bei platesne kerpe. Odelė lygi ir tvirta. Minkštimas sodrios tamsiai raudonos spalvos, sultingas, be ruožų ir sukietėjusio pluošto žiedų. Šakniavaisiai sukaupia daug sausųjų medžiagų ir cukrų. Burokėliai atsparūs grybinėms ligoms, ypač lapų rudmargei (cerkosporozei). Tinka šviežiam vartojimui, konservavimui ir ilgam laikymui.






200 sėklų


BRESKO F1

 Nauji, derlingi vidutinio vėlyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ Boro H segmento burokėliai, išauginantys tvirtą, vešlią lapiją. Vegetacijos trukmė – apie 110 dienų. Veislė atspari žyduolių formavimuisi, grybinėms ligoms, ypač lapų rudmargei (cerkosporozei), ir pakanti sausroms. Šakniavaisiai apvalūs, gražios tamsiai raudonos spalvos, nelinkę formuoti sukietėjusio pluošto žiedų. Minkštumas tamsiai raudonas, violetinio atspalvio, sultingas, ryškios ir intensyvios spalvos. Tinka šviežiam vartojimui, konservavimui ir ilgam laikymui.



200 sėklų


RHONDA F1

 Labai derlingi, vidutinio vėlyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ burokėliai, vėlyviausi mūsų asortimente. Vegetacijos trukmė – apie 120–125 dienas. Šakniavaisiai labai kokybiški, apvalūs, vienodo dydžio, tamsiai raudonos spalvos, nelinkę formuoti sukietėjusio pluošto žiedų. Odelė lygi, glotni ir švelni. Minkštumas tamsiai raudonas, violetinio atspalvio, be koncentrinė žiedų, sultingas ir išskirtinai saldaus skonio. Lapija vešli, labai atspari ligoms. Burokėliai gerai pakelia drėgmės trūkumą, yra atsparūs grybinėms ligoms, ypač lapų rudmargei (cerkosporozei). Dėl saldaus skonio puikiai tinka šviežiam vartojimui, sulčių spaudimui, konservavimui ir labai ilgam laikymui. Minkštumas sandėliavimo metu nepatamsėja, išlieka vienalytės struktūros, nekinta skonis.



200 sėklų

ALTO F1

 Labai derlingas vidutinio vėlyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ hibridas, išauginantis cilindro formos šakniavaisius. Vegetacijos trukmė – apie 125 dienas. Šakniavaisiai ilgi, vienodos formos, gražios tamsiai raudonos spalvos, su lyga ir plona odele. Labai gražiai atrodo nuplauti. Minkštumas sultingas, puikaus skonio, be sukietėjusio pluošto žiedinių tarpų. Greitai išverda, išvirę išlaiko ryškią ir intensyvią spalvą bei išskirtinai švelnų ir saldų skonį. Lapai vešlūs, statūs, o šaknys giliai įsišaknijusios, todėl sausros burokėliams nėra itin pavojingos. Tinkami šviežiam vartojimui, konservavimui ir ilgam laikymui. Cilindrinčius burokėlius rekomenduojama auginti lysvėse.

200 sėklų

TAUNUS F1



Labai derlingas, vėlyvas olandų firmos „Bejo Zaden“ hibridas, išauginantis vidutinio ilgio cilindro formos šakniavaisius. Vegetacijos trukmė – apie 130 dienų. Lapija kompaktiška, stati, o skrotelė nedidelė. Šakniavaisiai sodrios, tamsiai raudonos spalvos, su lyga ir glotnia odele, nelinkę išsikraipyti, todėl gaunamas labai vienodų ir lygių šakniavaisių derlius. Minkštimas be koncentrinų žiedų, skanus ir sultingas, sukaupia daug betanino. Greitai išverda, o išvirus išlieka ryški ir intensyvi spalva bei puikus skonis. Tinka šviežiam vartojimui, konservavimui ir ilgam laikymui. Cilindrinčius burokėlius rekomenduojama auginti lysvėse.




150 sėklų

BOLDOR



Vidutinio ankstyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ burokėlių veislė, užauginanti geltonos spalvos šakniavaisius. Vegetacijos trukmė – apie 105 dienos. Augalai yra gyvybingi ir vešlūs, šakniavaisiai lygūs ir vienodi, ryškiai geltonos spalvos, saldaus, burokėliams įprasto skonio. Geltoni burokėliai ypač tinka konservavimui ir šviežiam vartojimui, pavyzdžiui, sriuboms ir salotoms, nes jie nekeičia gaminamo produkto spalvos, kaip raudonieji burokėliai. Pasėjus vėliau ir derlių nuėmus rudenį, jie tinka laikymui.




150 sėklų

AVALANCHE



Išskirtiniai vidutinio ankstyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ burokėliai su baltos spalvos šakniavaisiais. Vegetacijos trukmė – apie 107 dienos. Šie burokėliai pasižymi labai geru, švelniu, saldžiu skoniu ir yra skirti šviežiam vartojimui, vegetariškų ir veganiškų patiekalų gamybai, termiškai neapdorotoms salotoms, sriuboms bei troškiniams. Jie taip pat puikiai tinka konservavimui. Balti burokėliai nepakeičia gaminio spalvos, todėl juos galima naudoti žymiai plačiau nei raudonuosius burokėlius. Vėlesnės sėjos derlius tinka laikymui.




BALTIEJI GŪŽINIAI KOPŪSTAI

Brassica oleracea L.



Krautman F1



30 sėklų

PAREL F1



Labai ankstyvi olandų firmos „Bejo Zaden“ kopūstai, puikiai žinomi ir vertinami Lietuvos bei Europos daržininkų, auginančių ankstyvuosius kopūstus pirmajai šviežių daržovių rinkai. Vegetacijos trukmė – apie 50–60 dienų nuo daigų pasodinimo. Šie kopūstai pasižymi puikiu ankstyvumu, derlingumu ir kokybės deriniu. Atsparūs jarovizacijai ir žemoms temperatūroms, todėl juos galima auginti lauke, po priedangomis ar šiltnamyje. Gūžės yra kompaktiškos, apvalios, tankios vidinės struktūros, šviesiai žalios spalvos, svorio nuo 1,2 iki 1,8 kg. Kopūstai turi švelnų, gaičių, saldoką skonį, yra traškūs ir turi didesnį vitamino C bei sausųjų medžiagų kiekį, todėl puikiai tinka šviežių salotų gaminimui.



30 sėklų

TIARA F1




Labai ankstyvi ir derlingi olandų firmos „Bejo Zaden“ kopūstai, skirti auginti po priedangomis arba lauke. Vegetacijos trukmė – apie 60 dienų po daigų pasodinimo. Šiai veislei būdingas ypač greitas ir subalansuotas augimas. Gūžės formuojasi itin sparčiai, o pirmuosius smulkesnius kopūstus galima pradėti kirsti jau po 50 dienų. Augalai nejarovizuoja, net ir pasodinti labai anksti. Gūžės yra kompaktiškos formos, geros vidinės struktūros, užauga iki 2 kg svorio, o jų spalva yra šiek tiek tamsesnė nei „Parel F1“ kopūstų. Šviesos trūkumas neturi įtakos nei derliui, nei skoniu. Sultingos, švelniai saldoko skonio gūžės puikiai tinka pirmosioms šviežių daržovių salotoms ir balandėliams gaminti. Rekomenduojame auginti tojams, kuriems reikia ypač ankstyvo stambesnių gūžių derliaus.

30 sėklų

CARAMBA F1



Šie olandų firmos „Bejo Zaden“ smailiagūžiai kopūstai rekomenduojami itin gardžioms salotoms gaminti. Vegetacijos laikotarpis – 70–80 dienų nuo daigų pasodinimo. Kopūstai tinkami auginti tiek vasaros, tiek rudens derliui. Gūžės yra kūgio formos, labai vienodo didumo, sveriančios 1–2 kg, atsparios trūkinėjimui, su trumpu vidiniu kotu. Lapai traškūs, švelnūs ir sultingi, su plonomis ir neketomis gyslomis. Šiai veislei būdingas saldžiai pikančiškas skonis. Rudeninio derliaus gūžės gali būti išlaikomos apie 2 mėnesius.



45 sėklos

MEGATON F1



Derlingiausi vidutinio vėlyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ kopūstai, skirti šviežiam vartojimui bei rudeniniam raugimui. Vegetacijos trukmė – apie 102 dienas nuo daigų pasodinimo. Kopūstai auga intensyviai, formuoja dideles, tankias, geros vidinės struktūros gūžes. Esant palankioms sąlygoms, gūžės gali užaugti iki 10 kg svorio! Kopūstai yra saldūs, traškūs ir sultingi, sukaupia daug cukrų bei vitamino C, todėl puikiai tinka raugimui ir šviežioms salotoms gaminti. Šis hibridas atsparus fuzariozei. Nustebinkite kaimynus užauginę stambiausią kopūstą!



45 sėklos

KRAUTMAN F1




Vidutinio vėlyvumo, ypač gero skonio olandų firmos „Bejo Zaden“ kopūstai, specialiai išvesti rudeniniam raugimui. Vegetacijos trukmė – apie 100–105 dienas po daigų pasodinimo. Dėl neprilygiamo raugintų kopūstų skonio ir kokybės, ši veislė yra viena populiariausių tarp Lietuvos daržininkų, auginančių kopūstus raugimui. Raugintus kopūstus galima ilgai laikyti. Traškūs, sultingi kopūstai taip pat puikiai tinka šviežioms salotoms gaminti. Gūžės apvalios, tankios vidinės struktūros, sveriančios 3–5 kg. Tvirti, statūs lapai gerai apsaugo gūžes nuo ligų ir kenkėjų. Ilgas derliaus nuėmimo laikotarpis: pasodinus pavasarį, derlių galima imti rugpjūčio pabaigoje, o vėlyvesniam rudens derliui – sodinama birželio pradžioje. Rudeninio derliaus kopūstai gali būti laikomi 2–3 mėnesius.





45 sėklos


JAGUAR F1


 Vidutinio vėlyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ hibridas, skirtas raugimui rudenį ir gūžių laikymui per žiemą. Vegetacijos trukmė – apie 127 dienos po daigų pasodinimo. Šie kopūstai tiek savo išvaizda, tiek skonio savybėmis tenkina net pačių reikliausių augintojų ir vartotojų poreikius. Energingas ir greitas augimas užtikrina gausų derlių. Stipri šaknų sistema leidžia išlaikyti gerus rezultatus net per sausą vasarą. Gūžės didelės, kietos, puikios vidinės struktūros, sveriančios 4–6 kg. Vidinis kotas trumpas. Rauginti kopūstai išsiskiria puikia kokybe ir skoniu, turi daug vitamino C, o jų būdinga spalva – skaidri, kremenė.



45 sėklos


KRAUTKAISER F1

 Laiko patikrinti, jau keliolika metų vieni populiariausi olandų firmos „Bejo Zaden“ kopūstai, skirti raugimui rudenį ir laikymui. Vegetacijos trukmė – apie 140 dienų po daigų pasodinimo. Kopūstai užauga 3–6 kg svorio. Gūžių vidinė struktūra tanki, gražios baltos spalvos, vidinis kotas trumpas. Lapai ploni, traškūs ir sultingi. Lapų gyslos plonos ir neketos. Didelis sausųjų medžiagų kiekis užtikrina gerą raugto produkto išėigą. Rauginti kopūstai išsiskiria patrauklia skaidria balta spalva. Kopūstai nereiklūs dirvožemiui, pakantūs skirtingoms augimo sąlygoms.



45 sėklos

LENNOX F1

 Populiarūs vėlyvi olandų firmos „Bejo Zaden“ kopūstai, skirti ilgam laikymui. Vegetacijos trukmė – apie 140 dienų. Gūžės didelės, kompaktiškos, žeminėms veislėms būdingos formos ir struktūros, sveria 3–5 kg. Stipri šaknų sistema leidžia net sausomis vasaromis išauginti gausų derlių. Dėl puikaus, saldoko skonio šie kopūstai puikiai tinka salotoms ir žieminiam raugimui.

45 sėklos

JUBILEE F1



Vėlyvi, derlingi olandų firmos „Bejo Zaden“ kopūstai, skirti ilgam laikymui ir raugimui žiemą raugimui. Vegetacijos trukmė – apie 149 dienos po daigų pasodinimo. Šie kopūstai apjungia raugimui skirtų ir ilgam sandėliavimui tinkamų veislių savybes. Patariama sodinti daigus iki gegužės 15 d., kadangi vegetacijos laikotarpis ilgas. Gūžės apvalios, sveria 4–5 kg, su trumpu vidiniu kotu ir švelniomis gyslomis. Lapai padengti storu vaško sluoksniu, apsaugančiu nuo ligų bei kenkėjų, tokių kaip amarai ir tripšai. Stipri šaknų sistema leidžia auginti gausų derlių net sausą vasarą. Šie kopūstai puikiai tinka raugimui, o gūžės gerai išsilaiško sandėliuojant.



ROPINIAI KOPŪSTAI

Brassica oleracea L.




Korist F1

30 sėklų

KORIST F1



Ankstyvas, greitai augantis olandų firmos „Bejo Zaden“ ropinių kopūstų hibridas, skirtas šviežiam vartojimui ir perdirbimui. Vegetacijos trukmė – apie 60 dienų. Ropelės apvalios, šiek tiek suplotos, nelinkusios sumedėti, su plona odele, svorio 200–300 gramų. Minkštumas baltos spalvos, saldaus skonio. Tinka visiems auginimo periodams: galima auginti anksti pavasarį po priedangomis ankstyvajam derliui, o sodinant vėliau – rudens derliui.




PEKINO KOPŪSTAI

Brassica rapa L.



Emiko F1




30 sėklų

MANOKO F1



Populiarus ankstyvas olandų firmos „Bejo Zaden“ hibridas. Vegetacijos trukmė – apie 50 dienų nuo daigų pasodinimo. Gūžės cilindro formos, vidutinio dydžio, standžiai ir tvirtai susuktos, sveriančios nuo 0,5 iki 1,2 kg. Hibridas nelinkęs formuoti žyduolių, atsparus lapų galiukų nekrozei ir pakantus šaltam orui. Tinka sodinti anksti ir auginti po priedangomis arba plevėle dengtuose šildomuose šiltnamiuose.



30 sėklų

EMIKO F1




Vidutinio ankstyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ hibridas. Vegetacijos trukmė – apie 63 dienas. Universalus – galima auginti ankstyvajam, vasaros bei rudens derliui. Hibridas atsparus gūžių puviniiui ir kopūstų šaknų gumbui. Gūžės kietos, standžiai susuktos, patrauklios cilindro formos, vidutinio dydžio, sveriančios apie 0,9–1,6 kg. Išoriniai lapai platūs, tankūs, pakilę, tamsiai žalios spalvos. Norint užauginti smulkesnių gūžių, galima sodinti tankiau. Užaugusių gūžių derliaus nuėmimo laikotarpis ilgas, o rudeninio derliaus gūžės gali būti laikomos apie 2 mėnesius.

30 sėklų

BILKO F1



Vidutinio vėlyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ hibridas vasaros bei rudens derliui. Vegetacijos trukmė trunka apie 70 dienų po daigų pasodinimo. Lietuvos ir Lenkijos daržininkų tarpe kininiai bastučiai „Bilko F1“ yra labai populiarūs dėl išskirtinai ilgo sandėliavimo laikotarpio ir puikios gūžių kokybės. Gūžės cilindro formos, vidutinio dydžio, tankios, sveriančios 1,2–1,5 kg, gero skonio, ilgai išsaugo gražią, šviežios žalumos spalvą. Išoriniai lapai platūs, tamsiai žali, šiek tiek klostyti, mažai jautrūs ligoms. Hibridas pasižymi atsparumu šaknų gumbo ligų sukėlėjams. Ilgam laikymui skirtus kininio bastučio daigus rekomenduojama sodinti liepos mėn. antroje pusėje.



KININIAI BASTUČIAI (PAK-CHOI)

Brassica chinensis L.



Bopak F1

30 sėklų

BOPAK F1



Ankstyvas olandų firmos „Bejo Zaden“ hibridas. Vegetacijos trukmė – apie 45 dienas nuo daigų pasodinimo. Užaugina vešlius, mėsingus, stačiai augančius tamsiai žalios spalvos lapus su baltais, sultingais lapkočiais. Hibridas atsparus 0,1,3 rasės šaknų gumbo (lot. *Plasmodiophora brassicae*) sukėlėjui. Kad išvengtų sužydėjimo rizikos, rekomenduojama sodinti į lauką po gegužės mėn. 15 dienos.



ŽIEDINIAI KOPŪSTAI

Brassica oleracea L.



Naujiena

Skywalker F1



Naujiena

Flamenco F1




30 sėklų

GOODMAN



Vidutinio ankstyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ veislė, auginama po priedangomis ar lauke. Vegetacijos trukmė – apie 75 dienos. Derlius užauga iškart po pačių ankstyviausių pavasariųjų veislių. Žiedynai yra patrauklios baltos spalvos, tankios struktūros, sveriantys 1,2–1,5 kg, ir kokybe prilygsta vėlyvesnėms veislėms. Veislę galima auginti kaip antrąjį derlių, pasodinant liepos viduryje.



20 sėklų

FLAMENCO F1

Naujiena



Derlingi vidutinio vėlyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ žiediniai kopūstai, skirti vasaros ir rudens derliui. Vegetacijos trukmė – apie 75 dienos nuo daigų pasodinimo. Lapija stipri, plati, iki pat derliaus nuėmimo gerai dengia žiedyną nuo saulės. Hibridas pasižymi labai stipria šaknų sistema, todėl puikiai pakelia sausą, karštą orą ir drėgmės trūkumą. Žiedynai sniego baltumo, smulkiai grūdėti, kompaktiškos formos, vidutinio dydžio, sveriantys nuo 0,8 iki 1,5 kg. Tinka šviežiam vartojimui, šaldymui ir konservavimui.


20 sėklų

SKYWALKER F1

Naujiena



Vėlyviausi olandų firmos „Bejo Zaden“ žiediniai kopūstai, skirti rudeniniam derliui. Vegetacijos trukmė – apie 96 dienos nuo daigų pasodinimo. Augalai yra labai gyvybingi ir tvirti, gerai pakelia nepalankias augimo sąlygas, be to, yra atsparūs grybinėms ir bakterinėms ligoms. Žiedynai dideli ir sunkūs, užaugantys iki 1,5-3,0 kg svorio, gerai apgaubti lapais, visiškai balti, neturintys polinkio į kitų spalvų intarpus. Puikiai tinka tiek šviežiam vartojimui, tiek perdirbimui – šaldymui ar konservavimui. Išsiskiria subtiliu, švelniu, ne per daug sodriu ar intsyviu skoniu.



LAPINIAI KOPŪSTAI (KALE)

Brassica oleracea L.




Reflex F1

20 sėklų

REFLEX F1



Populiarus tarp profesionalių augintojų, vėlyvas olandų firmos „Bejo Zaden“ garbanotųjų lapinių kopūstų hibridas. Vegetacijos trukmė – apie 128 dienos nuo daigų pasodinimo. Augalai vidutinio aukščio, lapai žali, smulkiai garbanoti, sultingi, o apatiniai lapai yra atsparūs geltimui. Šie kopūstai tinka tiek šviežiam vartojimui, tiek užšaldymui. Derlių galima skinti pagal poreikį, daug kartų. Vėlyvam derliui rekomenduojama sodinti birželio mėn. pradžioje. Augalai atsparūs šalnoms ir puikiai pakelia šaltį iki -12 °C. Vėsaus oro ir šalnų bijoti nereikia, nes tai dar labiau sustiprina garbanotųjų kopūstų aromatą ir skonį.



GARBANOTIEJI KOPŪSTAI


Brassica oleracea L.



Melissa F1



Wirosa F1



20 sėklų

MELISSA F1



Vidutinio ankstyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ savojučių kopūstų hibridas, skirtas auginti vasaros ir rudens derliui. Vegetacijos trukmė – apie 80 dienų nuo daigų pasodinimo. Gūžės standžiai susuktos, geros vidinės struktūros, užauga 1,5–2,5 kg svorio. Lapai gofruoti, susiraukšlėję, šiek tiek skiriasi konsistencija nuo baltagūžių kopūstų – turi daugiau baltymų ir vitaminų, pasižymi švelniu skoniu. Tinka salotoms, pyragų įdarams, balandėliams gaminti. Esant poreikiui, galima sodinti tankiau, kad užsiauginti smulkesnių, kompaktiškų gūžių. Gerai auga įvairiose dirvose, nereiklūs tręšimui. Aukštas atsparumas (HR): kopūstų fuzariozei (FOC). Vidutinis atsparumas (IR): baltosioms rūdims (Ac). Rudeninis derlius tinka neilgam sandėliavimui.



20 sėklų

WIROSA F1



Vėlyvas olandų firmos „Bejo Zaden“ savojučių kopūstų hibridas, skirtas auginti rudens derliui ir ilgam sandėliavimui. Vegetacijos trukmė – apie 135 dienos nuo daigų pasodinimo. Gūžės apvalios, standžiai susuktos, užauga 2–3 kg svorio, patrauklios išvaizdos. Lapai susiraukšlėję, nusėti smulkiais burbuliuko formos iškilimais, tamsiai žalios spalvos. Kopūstai yra švelnaus skonio, tinka salotoms, pyragų įdarams ir balandėliams gaminti. „Wirosa F1“ yra nereiklus dirvožemiui ir tręšimui, pakantus temperatūrų pokyčiams ir drėgmės trūkumui, todėl net ir skurdžiose dirvose užauginamas pakankamas derlius. Bandymų metu nepilnai subrendusios „Wirosa F1“ gūžės toleravo ir šiek tiek didesnį nei -12 °C šaltį.

BROKOLIAI

Brassica oleracea L.



Naujiena



Lucky F1



30 sėklų

BATAVIA F1



Greitai augantys, ankstyvi olandų firmos „Bejo Zaden“ brokoliai. Galima auginti po priedangomis, tinka auginti ankstyvajam bei vasaros derliui. Vegetacijos trukmė – apie 59–68 dienos po daigų pasodinimo. Žiedynai apvalūs, sunkūs, vienodo dydžio, nelinkę sužydėti. Koteluose neatsiranda tuščių ertmių. Hibridas išsiskiria atsparumu netikrajai miltligei ir grybelinėms ligoms. Aukštas atsparumas (HR): FOC (kopūstų fuzariozė - *Fusarium oxysporum* f. sp. *conglutinans*). Vidutinis atsparumas (IR): baltosioms rūdims (Ac - *Albugo candida*). Tinka šviežiam vartojimui ir konservavimui.



30 sėklų

LUCKY F1

Naujiena




Derlingi, vidutinio ankstyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ brokoliai, skirti ankstyvos vasaros ir rudens derliui. Vegetacijos trukmė – apie 70 dienų po daigų pasodinimo. Žiedynai yra tvirti, sunkūs, sveriantys apie 500–700 g, vienodo dydžio, atsparūs sužydėjimui, neturi polinkio sudaryti tuščių žiedynkočio ertmių. Gerai laikosi po derliaus nuėmimo. Hibridas išsiskiria atsparumu grybinėms ligoms, turi vidutinį atsparumą (IR) baltosioms rūdims (Ac - *Albugo candida*) ir juodajam puvinui (Xcc - *Xanthomonas campestris* pv. *campestris*). Tinka šviežiam vartojimui ir konservavimui.



30 sėklų

FIESTA F1

 Populiarūs olandų firmos „Bejo Zaden“ brokoliai, skirti vasaros ir rudens derliui. Vegetacijos trukmė – apie 80 dienų po daigų pasodinimo. Derlius gausus, žiedynai stambūs, tamsiai žalios spalvos, labai kokybiški, smulkiais žiedynėliais, puikaus skonio. Lapija vešli, mėlynai žalios spalvos, padengta plonu vaško sluoksniu. Nupjovus pagrindinį žiedyną, atželia mažesni šoniniai žiedynėliai. Hibridas gerai auga ir laikosi lauke, netgi esant prastoms oro sąlygoms. Aukštas atsparumas (HR): FOC (kopūstų fuzariozė - *Fusarium oxysporum* f. sp. *conglutinans*). Vidutinis atsparumas (IR): baltosioms rūdimis (Ac - *Albugo candida*), juodajam puviniiui (Xcc - *Xanthomonas campestris* pv. *campestris*). Tinka šviežiam vartojimui ir konservavimui.

KRAPAI

Anethum graveolens L.




Naujiena

Lena



Naujiena


Thalia



3 g

LENA

Naujiena

 Žemaūgė prancūzų firmos „Graines Voltz“ krapų veislė ypač tinkama auginti vazonėliuose, love-liuose, ant palangių ar šiltnamiuose ankstyvą pavasarį ir rudenį, taip pat lauke visą sezoną. Šios veislės augalai yra kompaktiški, neaukšti, su staciais lapeliais, kurie gerai šakojasi ir suformuoja vešlią, kvapnią ir aromatingą tamsiai žalios spalvos lapiją.



3 g

THALIA

Naujiena



Universalūs prancūzų firmos „Graines Voltz“ krapai tinkami auginti visus metus – tiek vasarą lauke, tiek pavasarį ir rudenį šiltnamiuose. Auga greitai ir energingai, išsiskiria neaukštu, vešliu augimu bei vėlyvu žiedyno formavimu. Lapeliai tamsiai žalios spalvos, sveiki ir aromatingi.



3 g

HERA



Vėlai pražystantys krapai pasižymi stačiai augančia, tankia ir vešlia lapija, turinčia daug smulkių aromatingų lapelių, kurie išsiskiria išskirtine tamsiai žalia spalva su melsvu atspalviu. Galima auginti vazonėliuose, loveliuose, šiltnamiuose ir lauke. Tinka šviežiam vartojimui, konservavimui, šaldymui ir džiovinimui.

3 g

DIANA



Vidutinio ankstyvumo derlinga vokiška veislė, pasižyminti kompaktiškais, neaukštais augalais. Lapija yra stati, tvirta ir labai vešli, ypač vėlai formuojanti žiedynus. Tamsiai žali lapeliai skleidžia malonų kvapą ir yra aromatingi, taip pat atsparūs ligoms.

3 g

DUKAT



Tamsiai žalios spalvos krapai su vešlia, kompaktiška lapija, formuojantys daug žaliosios masės. Auga lėčiau, vėliau pražysta, todėl lapelių derlių galima imti ilgiau. Intensyvus aromatas, augalas sukaupia daug eterinių aliejų. Tinkami džiovinimui, šaldymui ir konservavimui. Tinka auginti visą sezoną.

SALIERAI


Apium graveolens L.



Diamant



Tango




100 sėklų

BRILLIANT



Derlinga ir gerai žinoma olandų firmos „Bejo Zaden“ šakninių salierų veislė, išsiskirianti tamsiai žaliais, pakiliais lapais. Vegetacijos trukmė – apie 145 dienos nuo daigų pasodinimo. Suformuoja kietus, lygius, puikios kokybės šakniavaisius, tinkamus šviežiam vartojimui, konservavimui ir ilgam laikymui. Veislė nelinkusi formuoti tuščių ertmių gumbuose, o šakniavaisiai išlaiko idealiai baltą minkštimą tiek ilgai laikant, tiek verdant.



100 sėklų

DIAMANT



Olandų firmos „Bejo Zaden“ šakninių salierų veislė išsiskiria šviesesniais, labiau išsikerojusiais lapais. Vegetacijos trukmė – apie 150 dienų nuo daigų pasodinimo. Stipri šaknų sistema leidžia net sausomis vasaromis išauginti gausų derlių. Šakniavaisiai formuojasi virš žemės, o šaknų raizginys nukreiptas žemyn, todėl derliaus nuėmimas ir šaknų pašalinimas yra lengvesnis. Šakniavaisiai nelinkę formuoti tuščių ertmių, ilgai išsaugo idealiai baltą minkštimo spalvą, puikų skonį, yra aromatingi ir gerai išsilaiko per žiemą.

100 sėklų

TANGO



Olandų firmos „Bejo Zaden“ lapkotinių salierų veislė pasižymi tamsiai žaliais lapais ir ilgais, lygiais, šviesiai žaliais lapkočiais. Vegetacijos trukmė – apie 80 dienų nuo daigų pasodinimo. Augalai yra vienodos formos, be šoninių atžalų, auga tiesūs ir formuoja gražią, kompaktišką, traškių ir sultingų stiebų skrotele. Veislė labai atspari puviniai ir lapų ligoms, nelinkusi formuoti žydičių atžalų.



PANKOLIAI

Foeniculum vulgare Mill.



Orion F1

50 sėklų

ORION F1

Naujiena



Derlingi vidutinio ankstyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ pankoliai, suformuojantys plokščiai apvalius, baltus, mėsingus gumbus. Vegetacijos laikotarpis trunka apie 85 dienas nuo sudygimo. Augalai stiprūs, sveiki, pasižymi energingu augimu, tolerantiški lapų galiukų nudegimui ir ankstyvam žiedynų formavimuisi. Rekomenduojamas auginimo tankumas - apie 7 augalai / m².



PORAI

Allium porum L.



Columbus



100 sėklų

Zwitserse Reuzen - COLUMBUS



Labai derlinga olandų firmos „Bejo Zaden“ veislė, skirta rudeniniam derliui. Vegetacijos trukmė – apie 85 dienos. Augalai auga labai greitai. Stiebas masyvus, storas, užauga iki 35 cm ilgio, 350–400 g svorio, lengvai valomas. Lapai tamsiai žalios spalvos, tvirti, auga stačiai. Ilgas derliaus nuėmimo laikotarpis, nes augalai puikiai laikosi lauke net esant prastoms oro sąlygoms. Tinka džiovinimui ir šaldymui. Prieš žiemą nuimtas derlius tinkamas ilgesniam laikymui (rekomenduojama porus sudėti į dėžes vertikaliai ir baltąją dalį užpilti švari smėliu).



100 sėklų

Blauwgroene Herfst - LANCELOT



Labai derlinga, greitai auganti vidutinio vėlyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ veislė, skirta rudeniniam derliui. Vegetacijos trukmė – apie 100 dienų. Augalai auga sparčiai, todėl derlių galima išauginti ir anksčiau. Ilgas derliaus nuėmimo laikotarpis, nes augalai puikiai laikosi lauke net esant prastoms oro sąlygoms. Tamsiai žali lapai sukuria gražų kontrastą ilgai baltajai stiebo daliai, kuri užauga iki 30–35 cm. Veislė atspari alternariozei ir rūdimis. Tinka šviežiam vartojimui, džiovinimui ir šaldymui. Prieš žiemą nuimtas derlius tinkamas ilgesniam laikymui.



100 sėklų

Blauwgroene Winter - FORREST



Vėlyva olandų firmos „Bejo Zaden“ žieminių porų veislė, pakeitusi veislę „Blauwgroene Winter - Bandit“, skirta derliui vėlyvą rudenį ir žiemą. Vegetacijos trukmė – apie 140 dienų. Šie žieminiai porai suformuoja storą, 20–25 cm ilgio baltą stiebą, kuris beveik nestorėja ties šaknimis. Lapai melsvai žalios spalvos, auga stačiai. Tinka ilgam sandėliavimui. Pietiniuose regionuose peržiemoja lauke, o Lietuvos klimato sąlygomis rekomenduojama mulčiuoti.

LAIŠKINIAI SVOGŪNAI

Allium fistulosum L.



250 sėklų

PARADE



Gerai žinoma olandų firmos „Bejo Zaden“ laiškinių svogūnų veislė skirta vešlių laiškų auginimui. Vegetacijos trukmė – apie 60–75 dienos. Augalas neformuoja ropelės, šaknies dalyje nėra sustorėjimo. Laiškai tamsiai žali, statūs, standūs, nelinkę išgulti, puikios išvaizdos, sultingi ir švelnaus skonio. Gražus kontrastas tarp baltos svogūninės dalies ir tamsiai žalių laiškų. Vieno svogūno svoris – apie 15–20 g. Nupjauti laiškai greitai atauga, todėl per sezoną galima gauti kelis derlius. Kai laiškų skersmuo siekia 10–15 mm, raunamas visas augalas. Pageidaujamą laiškų storį ir ilgį galima reguliuoti keičiant augalų tankumą. Tinka šviežiam vartojimui ir šaldymui.



ROPINIAI SVOGŪNAI


ANON (Allium cepa L.)



Spirit F1



Mustang F1



200 sėklų

SPIRIT F1



Vidutinio ankstyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ svogūnai, pasižymintys vienu geriausių ankstyvumo, derlingumo ir sandėliavimo savybių deriniu. Vegetacijos trukmė – apie 112 dienų. Lietuvoje „Spirit F1“ yra mėgstama daržininkų ir nedidelių plotus auginančių ūkininkų dėl stabilaus ir kokybiško derliaus, nepriklausomai nuo augimo sąlygų ar patirties. Svogūnai sudrygsta greitai, o ropelės susiformuoja anksti, todėl derlius gali būti nuimamas jau rugpjūčio mėnesį, kai vėlyvesnės veislės dar nepasiekusios subrendimo. Ropelės yra plokščiai apvalios, su plonu kakleliu ir tvirtai prigludusiu, rusvu lukštu. Nepaisant ankstyvumo, svogūnai gerai laikosi sandėliuose. Vidutinis atsparumas (IR): Pt (Rausvasis puvinys).



200 sėklų

MUSTANG F1




Vidutinio ankstyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ svogūnai tinkami ilgam sandėliavimui. Vegetacijos trukmė – apie 114 dienų. Veislė išvesta sukryžminus Amerikos ir Rijnsburger tipo svogūnus, papildant „Spirit F1“ svogūnų segmentą. Ropelės yra didelės, masyvos, apvalios, padengtos storu, gerai prigludusiu bronzinio atspalvio lukštu. Stipri šaknų sistema užtikrina gerą derėjimą net sausomis vasaromis. Išskirtinis veislės bruožas – ypač didelis pakantumas stresinėms, nepalankioms augimo sąlygoms, todėl gaunama didžiausia pirmos klasės svogūnų išeiga. Vidutinis atsparumas (IR): Pt (Rausvasis puvinys).

200 sėklų

HYBOUND F1



Vidutinio ankstyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ Rijnsburger tipo svogūnai tinkami ypač ilgam sandėliavimui. Vegetacijos trukmė – apie 125 dienos. Tai pats geriausias ankstyvumo ir tinkamumo sandėliavimui derinys. Ropelės yra vienodo dydžio, apvalios, su plonu kakleliu, pavasarį nelinkusios atželti. Lukštas tvirtas, šviesiai rusvo atspalvio. Ši veislė pasižymi labai stipria šaknų sistema. Trumpesnis vegetacijos periodas net ir esant prastesnėms augimo sąlygoms lemia gausesnę derlių. Ankstyvesnis derlius leidžia subrendusius svogūnus tinkamai išdžiovinti lauke. Vidutinis atsparumas (IR): Pt (Rausvasis puvinys).




200 sėklų

HYBELLE F1



Derlingiausi vidutinio vėlyvumo olandų firmos „Bejo Zaden“ Rijnsburger tipo svogūnai skirti ilgam sandėliavimui. Vegetacijos trukmė – apie 135 dienos. Ši veislė ypač gerai dera sunkiose dirvose. Vešlius, tamsiai žalius laiškus dengia storas vaško sluoksnis. Ropelės apvalios, vienodo dydžio, gana stambios, su plonu kakleliu. Šaknų sistema gerai išvystyta ir stipri, todėl svogūnai gerai pakenčia sausas vasaras. Lukštas tvirtas, gerai priglundęs, šviesiai rusvo atspalvio. Ilgo sandėliavimo metu ropelės išsaugo kokybę ir patvarumą, o lukšto spalva nelinkusi kisti – neblunka ir netamsėja. Rekomenduojama augintojams, kurie svogūnus vartoja praėjus pusmečiui po derliaus nuėmimo. Vidutinis atsparumas (IR): Pt (Rausvasis puvinys).



100 sėklų

EXHIBITION F1



Labai dideli, sultingi, saldaus ir švelnaus skonio olandų firmos „Bejo Zaden“ salotiniai svogūnai skirti šviežiam vartojimui. Vegetacijos laikotarpis – apie 120–160 dienų. Ropelės pailgai ovalios, su storais kakleliais ir šviesiai geltonu lukštu. Svogūnai užauga iki 360–600 g svorio, o auginant ilgiau – net iki 1 kg! Dėl ilgos vegetacijos šiuos svogūnus patartina auginti sodinant daigais. Kuo ilgiau auga, tuo didesnės ropelės užauga. Veislė yra reikli tręšimui ir laistymui. Visiškai subrendusius, apdžiovintus svogūnus su gerai uždariusiu kakleliu, tinkamomis sąlygomis galima išlaikyti iki 3 mėnesių. Nustebinkite kaimynus užauginę didžiausią svogūną!




SALOTOS

Lactuca sativa L.



Spectation




50 sėklų

MODEL



Derlinga olandų firmos „Bejo Zaden“ Batavia tipo lapinių salotų veislė tinkama auginti visą sezoną. Aukštas atsparumas (HR): Bl:16-32, Nr:0, vidutinis atsparumas (IR): LMV:1.



50 sėklų

BIONDONNA



Derlinga olandų firmos „Bejo Zaden“ Lollo tipo lapinių salotų veislė, tinkama auginti visą sezoną. Aukštas atsparumas (HR): Bl:16-32, Nr:0, vidutinis atsparumas (IR): LMV:1.




50 sėklų

SPECTATION



Derlinga olandų firmos „Bejo Zaden“ Lollo tipo lapinių salotų veislė, auginama lauke ir šiltnamyje pavasario, vasaros ir rudens derliui. Lapeliai ryškios raudonos spalvos, vidutinio garbanotumo, traškūs, gero skonio, auga formuodami dekoratyvią sferinės formos skrotelę. Galima skinti apatinius lapus, kitus paliekant augti. Viena lapų skrotelė užauga iki 350-450 gramų svorio. Vegetacijos trukmė – apie 55 dienos po daigų pasodinimo. Norint užsiauginti ankstyvesnį derlių, rekomenduojama sodinti daigais. Aukštas atsparumas (HR): Bl:16-28, 30-32EU/Nr:0.



50 sėklų

TIMES



Greitai auganti olandų firmos „Bejo Zaden“ gūžinių ledinių (angl. „Iceberg“) salotų veislė, skirta auginti visą sezoną. Veislė pakanti vėsiam ir drėgnam orui. Standžiai susuktos, puikios vidinės struktūros, vidutinio dydžio, tamsios spalvos gūželės gerai užsidariusia plokščia apačia. Lapai traškūs, sultingi, gaivaus skonio. Vegetacijos trukmė 6 – 7 savaitės nuo daigų pasodinimo. Aukštas atsparumas (HR): Bl:16-33EU/Nr:0.



50 sėklų

RUMOURS



Greitai auganti olandų firmos „Bejo Zaden“ gūžinių ledinių (angl. „Iceberg“) salotų veislė. Gūžės vidutinio dydžio, plokščiai apvalios formos, tamsesnės spalvos. Užauga 500 – 600 gramų svorio. Veislė pakanti vėsiam ir drėgnam orui, skirta ankstyvam (pavasariui) ir vėlyvam (rudeniui) auginimui. Vegetacijos trukmė apie 8 savaites nuo daigų pasodinimo. Aukštas atsparumas (HR): Bl:16-33EU/Nr:0, vidutinis atsparumas (IR): LMV:1.






50 sėklų

MALIS



Sparčiai auganti olandų firmos „Bejo Zaden“ sviestinio tipo gūžinių salotų veislė, tinkama auginti visą sezoną. Gūžės žalios blizgančios spalvos, vidutinio stambumo, lygia apačia, lengva nuimti derlių. Vegetacijos trukmė 50 – 60 dienų nuo daigų pasodinimo. Aukštas atsparumas (HR): BI:16-33EU/Nr:0, vidutinis atsparumas (IR): LMV:1).



50 sėklų

SOTALIS



Labai derlingos, sparčiai augančios olandų firmos „Bejo Zaden“ sviestinio tipo gūžinės salotos. Gūžės stambios ir sunkios, užauga 500 – 700 gramų svorio, vienodo didumo, plokščia apačia. Tinka auginti visą sezoną. Vegetacijos trukmė 50 – 60 dienų nuo daigų pasodinimo. Geras atsparumas „lapų galiukų nudegimams“ (angl. tipburn). Aukštas atsparumas (HR): BI:16-33EU/Nr:0, vidutinis atsparumas (IR): LMV:1).

Leidinyje pateikiama informacija nesuteikia jokių UAB Baltic seeds įsipareigojimų, kadangi reklaminiuose leidiniuose, pvz., interneto tinklalapiuose, kataloguose ir brošiūrose esantys aprašymai, rekomendacijos ir iliustracijos yra artimiausios bandymų ir ilgametės praktikos patirtimi, nes sėklos yra natūralus produktas, todėl ir natūralių sąlygų skirtumai daro įtaką galutiniam auginimo rezultatui, kadangi pateikti sėjos, sodinimo, derliaus emimo ir laikymo terminai, tręšimo ir laistymo normos yra orientacinės, rekomendacinio pobūdžio, paremtos ilgametė Lietuvos augintojų praktika ir atliktais bandymais, o šie terminai ir normos gali kisti priklausomai nuo dirvožemio tipo, struktūros, derlingumo, susiklosčiusių gamtinių sąlygų, dienos ilgumo, auginimo būdo, augalų priežiūros, taikytų agrotechnikos bei augalų apsaugos priemonių ir kitų veiksnių, o šių veiksnių kitimas gali daryti esminę įtaką galutiniam rezultatui ir kiekvienas augintojas turi naudoti leidinyje pateikiamą informaciją, atsižvelgdamas į esamas sąlygas ir savo patirtį bei vadovautis rekomendacijomis tiek, kiek tai jo nuomone yra būtina.

UAB Baltic seeds neprisiima jokios atsakomybės už tokią informaciją, pagrįstą skirtingais rezultatais, gaunamais iš auginamų produktų. Augintojas turi nustatyti, ar produktai yra tinkami numatomam auginimo tikslui, ir (arba) gali būti naudojami vietinėmis sąlygomis ir poreikiais. Noredami gauti naujausią informaciją apie produktų formas ir specifikacijas, pareiškimus, intelektines teises, pardavimo ir pristatymo sąlygas, apsilankykite interneto svetainėje www.balticseeds.lt.

Intelektinės nuosavybės teisės. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Neteisėtas atkūrimas ir (arba) naudojimas yra draudžiamas. Šių teisių pažeidimas gali būti traktuojamas kaip nusizengimas, dėl kurio atsakovas įstatymu nustatyta tvarka gali būti patrauktas administracinė ar baudžiamojon atsakomybėn.

Nemokamas leidinys. © 2024 UAB Baltic seeds. Visos teisės saugomos. Leidinyje esantys tekstai, nuotraukos, grafiniai elementai ir kita medžiaga yra saugomi autorių teisių. Bet kokia informacijos panaudojimu privaloma gauti UAB Baltic seeds sutikimą. Premier Professional™ yra registruotas UAB Baltic seeds prekės ženklas. Iliustracijos, maketo grafiniai elementai © 2024 UAB Baltic seeds, © Bejo Zaden B.V.



UAB Baltic seeds

Tel. +370 69941662, www.balticseeds.lt
El. parduotuvė: parduotuve@balticseeds.lt
Didmeninė prekyba: prekyba@balticseeds.lt





Bejo Zaden daržovių sėklos profesionalams

Bejo Zaden B.V. atstovė Lietuvoje

UAB Aista

Jonavos g. 6-1, Kaunas 44269

Mob.: +370 68973688

el.p.: info@aista.lt

<http://www.bejo.lt>





**BALTIC
SEEDS**

